農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第三章 栽培法ニ関スル試験

第一節 精密試験

目的 播種期播種量苗代日数本田株間一株苗数等ノ相互関係ヲ下記計畫ニヨリ精密ニ試査セントス

方法 1.供試品種

第一期作 台中六五號

中間作 台中六五號 鶯蛋朮

第二期作 台中六五號

2.播種量植付株間及一株苗数次表ノ如シ

第一期作

區別			標準肥料區														
苗数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.B b.c.d.e.f.g.h 二合播	株間	18	○	○	○	○	○										
		20		○	○	○	○	○									
		22			○	○	○	○	○								
		24					○	○	○	○							
ABB'b'b'CD b.c.e.f.g.h 四合播	株間	18		○	○	○	○										
		20		○	○	○	○	○									
		22			○	○	○	○	○								
		24				○	○	○	○	○							
B a.b.c.d.e.f.g.h 六合播	株間	18		○	○	○	○	○									
		20			○	○	○	○	○								
		22				○	○	○	○	○							
		24					○	○	○	○	○						
B a.b.c.d.e.f.g.h 八合播	株間	18			○	○	○	○	○								
		20					○	○	○	○	○						
		22						○	○	○	○	○					
		24							○	○	○	○	○				

第二期作

區別			標準肥料區														
苗数			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. 二合播	株間	18		○	○	○	○	○									
		20			○	○	○	○	○								
		22					○	○	○	○	○						
		24						○		○	○	○					
A.B.C. 四合播	株間	18		○	○	○	○	○	○								
		20		○	○	○	○	○	○	○							
		22					○	○	○	○	○						
		24						○		○	○	○	○				
A. 六合播	株間	18			○	○	○	○	○								
		20					○	○	○	○	○						
		22						○	○	○	○	○					
		24							○	○	○	○	○				
A. 八合播	株間	18				○	○	○	○	○							
		20					○		○	○	○						
		22						○	○	○	○	○					
		24							○		○		○				

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

3 播種期挿秧期肥料並挿秧方法ニ関スル調査

第一期作

	播種期	播種量	挿秧期	標準肥料	標準肥料倍量	深植	洗根
A	1月20日	2合4合	3月14日	●			
B	1月30日	2合4合6合8合	3月28日	●			
B'	1月31日	4合	3月30日		●		
b	1月31日	4合	3月28日	●		●	
b'	1月31日	4合	3月30日	●			●
C	1月31日	4合	4月8日	●			
D	2月10日	4合	3月30日	●			

第二期作

	播種期	播種量	挿秧期
A	7月11日	2合4合6合8合	7月25日
B	7月12日	4合	7月28日
C	7月12日	4合	7月30日

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

中　間　作

台中大五號

播種期 月日	播種量 合	苗代日数 日	植付株間 糎	植付一株苗数 本
5.20	4	20.	21	2
			23	4
6.10	4	15	21	2
				4
			23	4
	6	15	21	4
			23	4
6.20	4	12	21	4
			23	4
		15	21	2
				4
			23	2
				4
		18	21	2
			23	2
	6	12	21	4
			23	4
		15	21	2
				4
			23	4
		18	21	4
			23	4

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895



農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

鵞　蛋　衣

播種期 月日	播種量 合	苗代日数 日	植付株間 糎	植付一株苗数 本
4.10	4	20	21	2
4.10	4	30	21	2
4.10	4	40	21	2
4.10	6	20	23	4
4.10	6	30	23	4
4.30	4	20	21	2
4.30	4	20	23	2
4.30	4	20	23	4
4.30	4	30	21	2
4.30	4	30	21	4
4.30	4	30	23	2
4.30	4	30	23	4
4.30	4	40	23	4
4.30	6	20	21	2
4.30	6	20	23	4
4.30	6	30	21	2
4.30	6	30	21	4
4.30	6	30	23	2
4.30	6	30	23	4
5.30	4	15	21	2
5.30	4	15	23	4
5.30	6	15	21	2
5.30	6	15	23	4

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

播種期 月 日	播種量 合	苗代日数 日	植付株間 糎	植付一株苗数 本
6.9	4	20	21	2
				4
			23	2
				4
	6	20	21	2
				4
			23	2
				4
6.19	4	15	21	2
				4
			23	2
				4
		20	21	2
				4
			23	2
				4
		25	21	2
			23	4
	6	15	21	2
				4
			23	2
				4
		20	21	2
				4
			23	2
				4
	8	20	23	4
				6
				8

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付一株苗数
月日	合	日	糎	本
6.29	4	15	21	2
			23	4
		20	21	2
			23	4
	6	15	23	4
	8	15	23	6

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

ノ苗代日数ニ関スル調査

第一期作

	播種期	播種量	挿秧期	
A	1月20日	2合4合	3月14日	※
a.	1月20日	6合8合	3月14日	
b.	1月20日	2合4合6合8合	3月24日	
B	1月30日	2合4合6合8合	3月28日	※
C.	1月30日	2合4合6合8合	4月7日	
D	2月10日	4合	3月30日	※
d.	2月10日	2合6合8合	3月30日	
e	2月10日	2合4合6合8合	4月9日	
f	2月20日	2合4合6合8合	3月31日	
g	2月20日	2合4合6合8合	4月10日	
h	2月29日	2合4合6合8合	3月31日	
	3月12日		直播	
	3月20日		直播	

備考　※印(イ)精密試験ト重復

直播試験区ノ株間ノ株苗数ハ2合播ト同様ナリ

調査　出穂期、成熟期、草丈、穂長穂数、籾及藁ノ収量品質等ヲ調査ス

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

第一期作

(イ) 第一期作

標準肥料區 (第一表)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	1.20	3.14	6.6	7.5	7.8	99.9	19.1	780.0	29.0	57.1
2	〃	〃	2	〃	〃	6.4	7.4	7.2	97.8	18.4	720.0	29.6	56.8
3	〃	〃	3	〃	〃	6.4	7.4	8.5	95.5	18.4	850.0	30.2	55.9
4	〃	〃	4	〃	〃	6.4	7.4	9.0	93.4	17.7	900.0	29.0	55.9
5	〃	〃	5	〃	〃	6.4	7.4	10.1	94.3	17.5	1010.0	29.4	58.8
6	〃	20	2	〃	〃	6.4	7.4	8.4	97.3	18.7	680.4	29.8	58.8
7	〃	〃	3	〃	〃	6.4	7.4	9.3	94.8	18.1	753.3	29.6	58.5
8	〃	〃	4	〃	〃	6.4	7.4	10.0	95.3	18.0	810.0	29.6	57.5
9	〃	〃	5	〃	〃	6.3	7.3	11.2	92.4	17.8	907.2	29.4	55.6
10	〃	〃	6	〃	〃	6.3	7.3	12.0	90.0	17.2	972.0	29.8	57.8
11	〃	22	3	〃	〃	6.4	7.4	10.7	95.8	18.8	716.9	30.0	58.8
12	〃	〃	4	〃	〃	6.3	7.4	11.8	92.7	18.3	790.6	30.0	58.5
13	〃	〃	5	〃	〃	6.3	7.4	12.7	93.8	18.3	850.9	30.0	58.8
14	〃	〃	6	〃	〃	6.3	7.4	12.6	90.4	17.7	844.2	30.2	57.5
15	〃	〃	7	〃	〃	6.3	7.3	12.7	91.7	18.2	850.9	29.8	57.5
16	〃	24	5	〃	〃	6.4	7.4	12.9	92.4	18.1	722.4	30.2	58.8
17	〃	〃	6	〃	〃	6.3	7.3	14.4	93.6	17.8	806.4	30.0	59.5
18	〃	〃	7	〃	〃	6.3	7.3	15.7	90.9	18.0	879.2	29.8	58.1
19	〃	〃	8	〃	〃	6.3	7.3	15.5	93.6	18.2	868.0	29.6	60.2

備考 粒重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数3

（A）

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	ℓ	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4739.0	8299.5	4705.4	24.2	81.3	90.0	80	2.0	稍良	112.8
4369.3	7692.4	4705.4	24.8	80.6	94.0	5.0	1.0	〃	104.0
4604.6	8237.2	4369.3	25.4	81.3	95.0	4.0	1.0	〃	109.6
4335.7	7756.2	4033.2	24.8	81.3	97.0	0	3.0	良	103.2
4907.1	8345.3	6722.0	25.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	116.8
3967.1	6746.8	4083.8	25.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	94.4
4200.5	7180.3	4667.2	24.8	81.3	95.0	2.0	3.0	〃	100.0
4375.5	7609.6	4667.2	25.0	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	104.2
4258.8	7659.7	5834.0	25.0	80.6	96.0	0	4.0	〃	101.4
4346.3	7519.6	5250.6	25.0	81.3	98.0	0	2.0	〃	103.5
4081.8	6941.8	4785.5	25.2	81.3	96.0	3.0	1.0	〃	97.2
4278.8	7314.2	4785.5	25.2	82.0	98.0	1.0	1.0	〃	101.9
4419.6	7516.2	4785.5	25.2	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	105.2
3969.2	6902.9	4785.5	25.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	94.5
4307.0	7490.3	5067.0	25.2	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	102.5
3772.8	6416.3	4363.1	25.4	81.3	96.0	0	4.0	〃	89.8
3978.1	6685.8	4363.1	25.2	82.0	96.0	0	4.0	〃	94.7
4106.4	7067.8	4619.7	25.0	81.3	97.0	0	3.0	〃	95.6
4157.7	6906.5	4619.7	25.0	81.3	96.0	0	4.0	〃	99.0

本植ヲ１００トセリ

第二表 (A)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	1.20	3.14	6.3	7.3	6.9	92.9	18.5	690.0	29.8	58.5
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	8.2	89.8	18.1	820.0	29.6	57.5
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	8.5	88.4	17.7	850.0	30.2	58.1
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	10.1	88.6	17.5	1010.0	29.4	58.1
5	〃	20	2	〃	〃	〃	〃	8.3	94.3	18.3	672.9	29.8	58.8
6	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	9.1	92.0	17.6	737.1	29.4	58.1
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	10.3	90.4	17.7	834.3	29.8	59.9
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	10.6	88.1	17.1	858.6	29.6	58.1
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	11.6	87.9	16.7	939.6	29.8	57.1
10	〃	22	3	〃	〃	〃	〃	10.0	94.4	18.7	670.0	29.4	57.5
11	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.3	92.4	17.5	757.1	29.6	58.5
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.5	92.1	18.0	837.5	29.8	58.5
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.0	92.5	17.6	871.0	29.8	58.5
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	13.7	91.1	17.2	917.9	29.6	58.5
15	〃	24	4	〃	〃	〃	〃	12.1	95.3	18.0	677.6	29.6	58.1
16	〃	〃	5	〃	〃	6.4	〃	13.2	93.1	18.5	739.2	29.8	58.8
17	〃	〃	6	〃	〃	6.3	〃	14.4	93.4	17.6	806.4	29.8	58.8
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.6	93.2	17.5	873.6	29.6	59.2
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	16.2	94.0	17.5	907.2	29.8	58.8

備考 籾重量指数ハ4合播株間20 cm一株苗数

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄米						籾重量
一ヘクタール重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3865.2	6607.1	4033.2	25.0	82.0	96.0	1.0	3.0	良	98.9
3966.0	6897.4	4369.3	24.8	82.0	95.0	0	5.0	〃	101.5
3865.2	6652.6	4369.3	25.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	98.9
4470.1	7693.9	5377.6	25.0	80.6	97.0	1.0	2.0	〃	114.4
3850.4	6548.4	4375.5	25.6	82.6	97.0	2.0	1.0	〃	98.5
3908.8	6727.7	4375.5	24.6	81.3	97.0	0	3.0	〃	100.0
3850.4	6428.1	4375.5	25.0	82.6	97.0	0	3.0	〃	98.5
3762.9	6476.6	4083.8	25.0	82.0	98.0	0	2.0	〃	96.3
4113.0	7203.1	4667.2	25.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	105.2
3800.3	6609.1	3941.0	25.2	81.3	97.0	0	3.0	〃	97.2
3884.7	6640.5	4504.0	25.0	82.0	98.0	0	2.0	〃	99.4
4025.5	6881.1	4222.5	25.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	103.0
3997.3	6833.0	4785.5	25.0	82.6	98.0	0	2.0	〃	102.3
3941.0	6736.8	4504.0	24.8	82.0	96.0	1.0	3.0	〃	100.8
3701.7	6371.2	4078.1	24.8	82.6	97.0	1.0	2.0	〃	94.7
3748.7	6375.4	3450.7	25.0	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	95.9
3717.3	6322.0	4705.5	25.0	82.6	95.0	0	5.0	〃	95.1
4125.2	6968.2	2666.5	24.8	82.0	97.0	2.0	1.0	〃	105.5
4120.5	7015.6	3607.6	25.0	81.3	97.0	0	3.0	〃	105.5

3本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第三表（B）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	2	18	1	1.30	3.28	6.10	7.10	6.2	97.7	19.1	620.0	28.0	56.2
2	〃	〃	2	〃	〃	6.8	7.8	7.1	97.3	19.2	710.0	29.2	56.5
3	〃	〃	3	〃	〃	6.8	7.8	8.2	92.3	18.1	820.0	29.2	57.8
4	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.8	8.8	91.5	17.7	880.0	29.2	57.8
5	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.8	9.5	91.2	17.5	950.0	29.4	58.5
6	〃	20	2	〃	〃	6.10	7.10	8.0	98.5	18.7	648.0	28.8	58.5
7	〃	〃	3	〃	〃	6.8	7.8	9.2	95.9	17.9	745.2	28.8	59.5
8	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.8	9.0	94.1	18.1	729.0	29.2	58.5
9	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.8	11.1	94.5	18.2	899.1	28.8	57.5
10	〃	〃	6	〃	〃	6.8	7.8	11.6	93.9	17.0	939.6	29.2	58.1
11	〃	22	3	〃	〃	6.9	7.9	10.0	100.0	18.6	670.0	28.4	58.5
12	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.9	12.0	102.5	18.5	804.0	28.4	57.1
13	〃	〃	5	〃	〃	6.10	7.10	13.3	99.6	18.4	891.1	28.8	58.5
14	〃	〃	6	〃	〃	6.7	7.7	12.7	96.9	17.9	850.9	29.4	58.5
15	〃	〃	7	〃	〃	6.7	7.7	13.7	94.2	17.7	917.9	29.4	58.5
16	〃	24	5	〃	〃	6.8	7.8	13.0	97.3	18.5	772.8	29.0	57.1
17	〃	〃	6	〃	〃	6.8	7.8	13.9	96.5	17.6	778.4	28.8	58.5
18	〃	〃	7	〃	〃	6.8	7.8	15.9	92.1	18.1	890.4	29.0	57.5
19	〃	〃	8	〃	〃	6.8	7.8	16.1	96.7	17.6	901.6	28.6	57.5

備考　粒重量指数ハ２合播株間２０cm一株苗数３

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
kg	ℓ	kg	g	kg	%	%	%		%
3857.1	6863.2	4537.8	23.4	82.0	99.0	0	1.0	良	100.8
3983.2	7049.9	4789.9	24.6	826	98.0	1.0	1.0	〃	104.1
4109.2	7109.4	5042.0	24.4	82.6	97.0	0	3.0	〃	107.3
3831.9	6629.6	5042.0	24.4	82.6	99.0	0	1.0	〃	100.1
4109.2	7024.3	4033.6	24.6	82.6	98.0	0	2.0	〃	107.3
3587.5	6132.5	3500.0	24.4	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	93.7
3828.1	6433.8	4375.0	24.6	82.0	99.0	0	1.0	〃	100.0
3959.4	67682	4375.0	24.4	82.6	98.0	0	2.0	〃	103.4
3871.9	6733.7	3500.0	24.2	80.6	98.0	0	2.0	〃	101.1
3959.4	6814.8	5250.0	24.4	81.3	99.0	0	1.0	〃	103.4
3694.3	6315.0	3377.6	24.2	82.6	98.0	0	2.0	〃	96.5
3926.5	6876.5	3799.8	24.2	82.6	98.0	0	2.0	〃	102.6
4010.9	68562	3799.8	24.0	82.6	99.0	0	1.0	〃	104.8
4010.9	6856.2	4855.3	24.6	82.6	97.0	0	3.0	〃	104.8
4137.6	70728	3588.7	24.6	82.0	97.0	1.0	3.0	〃	108.1
3811.5	6675.1	3415.0	24.2	82.6	99.0	0	1.0	〃	99.6
3715.3	6350.9	36575	24.2	82.6	98.0	1.0	1.0	〃	97.1
3773.0	6561.7	3657.5	24.2	82.6	99.0	0	1.0	〃	98.6
3984.8	6930.0	4235.0	24.4	82.0	99.0	0	1.0	〃	104.1

本植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第四表 (B)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	1.30	3.28	6.11	7.11	7.2	97.6	18.6	720.0	28.4	57.1
2	〃	〃	3	〃	〃	6.11	7.11	8.7	94.6	17.4	870.0	28.4	58.8
3	〃	〃	4	〃	〃	6.10	7.10	9.6	94.5	17.9	960.0	28.8	58.1
4	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.9	10.7	89.5	17.8	1070.0	29.2	57.8
5	〃	20	2	〃	〃	6.11	7.11	8.2	99.2	18.5	664.2	28.4	58.8
6	〃	〃	3	〃	〃	6.10	7.10	9.6	96.7	18.9	777.6	28.2	57.5
7	〃	〃	4	〃	〃	6.10	7.16	10.3	95.9	18.3	834.3	28.2	58.1
8	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.9	11.5	96.8	17.7	931.5	29.0	58.8
9	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.9	12.0	94.8	17.7	972.0	29.0	58.8
10	〃	22	3	〃	〃	6.11	7.11	11.5	102.0	18.9	770.5	28.4	57.1
11	〃	〃	4	〃	〃	6.11	7.11	13.8	105.1	19.1	924.6	27.6	57.1
12	播	〃	5	播	挿	6.11	7.11	13.4	98.4	17.8	897.8	28.4	57.5
13	〃	〃	6	〃	〃	6.10	7.10	14.2	95.6	17.8	951.4	28.6	58.1
14	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.10	14.4	91.4	17.5	964.8	28.8	57.9
15	〃	24	4	〃	〃	6.11	7.11	12.9	97.8	18.7	722.4	28.4	58.8
16	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.11	14.0	95.3	17.7	784.0	27.2	58.1
17	〃	〃	6	〃	〃	6.10	7.10	14.9	95.5	18.2	834.4	28.2	58.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.10	15.6	93.4	18.1	873.6	28.2	59.2
19	〃	〃	8	〃	〃	6.10	7.10	15.6	92.3	17.5	873.6	28.8	58.5

備考 籾重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾 一ヘクタール当重量 (kg)	籾 一ヘクタール当容量 (L)	一ヘクタール当藁重量 (kg)	玄米 千粒重量 (g)	玄米 一ヘクトリツトル重量 (kg)	玄米 良米 (%)	玄米 青米 (%)	玄米 死米 (%)	玄米 品質	籾重量指数 (%)
3806.7	6666.7	3277.3	23.6	82.0	94.0	4.0	2.0	良	96.7
4109.2	6988.5	4033.6	23.8	82.0	95.0	3.0	2.0	〃	104.4
3932.8	6769.0	4537.8	24.0	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	99.9
4411.8	7632.8	4537.8	24.6	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	112.0
3762.5	6398.8	3937.5	23.6	82.0	92.0	4.0	4.0	〃	95.6
3937.5	6847.8	3500.0	23.4	82.0	93.0	5.0	2.0	〃	100.0
3871.9	6664.2	3937.5	24.0	81.3	97.0	0	3.0	〃	98.3
4112.5	6994.0	4156.3	24.2	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	104.4
4068.8	6919.6	3937.5	24.4	82.0	93.0	4.0	3.0	〃	103.3
4032.0	7061.3	3166.5	23.8	81.3	96.0	0	4.0	〃	102.4
4602.0	8059.5	4855.3	23.2	81.3	88.0	9.0	3.0	稍良	116.9
4222.0	7342.6	3799.8	23.8	81.3	89.0	11.0	0	〃	107.2
4222.0	7266.8	3588.7	23.8	81.3	89.0	10.0	1.0	〃	107.2
4074.2	6801.7	3377.6	24.0	81.3	92.0	6.0	2.0	良	103.5
3984.8	6776.8	3272.5	23.6	81.3	87.0	11.0	2.0	稍良	101.2
3927.0	6759.0	3465.0	23.2	82.0	89.0	11.0	0	〃	99.7
3907.8	6645.8	3465.0	24.0	82.0	93.0	5.0	2.0	〃	99.2
3830.8	6470.9	3080.0	23.8	82.0	93.0	5.0	2.0	良	97.3
3792.3	6482.5	3465.0	23.2	81.3	95.0	4.0	1.0	稍良	96.3

3本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第 五 表 （B）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	6	18	2	1.30	3.28	6.13	7.10	7.3	92.7	18.3	730.0	28.4	58.8
2	〃	〃	3	〃	〃	6.13	7.10	8.5	91.6	18.2	850.0	27.6	57.1
3	〃	〃	4	〃	〃	6.12	7.10	10.0	91.8	18.1	1000.0	28.2	57.2
4	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	10.4	91.7	17.5	1040.0	28.8	58.5
5	〃	〃	6	〃	〃	6.10	7.9	11.3	89.5	17.4	1130.0	29.2	59.5
6	〃	20	3	〃	〃	6.12	7.10	10.2	98.2	18.5	826.2	27.6	57.8
7	〃	〃	4	〃	〃	6.12	7.10	11.2	96.1	18.3	907.2	27.8	57.5
8	〃	〃	5	〃	〃	6.12	7.10	12.4	98.6	18.5	1004.4	27.8	58.5
9	〃	〃	6	〃	〃	6.10	7.9	13.7	97.6	18.0	1109.7	27.8	57.9
10	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.9	15.0	94.3	17.6	1215.0	28.0	58.1
11	〃	22	4	〃	〃	6.12	7.10	13.8	99.5	18.0	924.6	27.6	58.1
12	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	13.6	98.3	18.0	911.2	27.6	58.1
13	〃	〃	6	〃	〃	6.11	7.9	15.6	98.9	18.1	1045.2	27.8	56.8
14	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.8	16.2	96.5	17.7	1085.4	27.0	57.5
15	〃	〃	8	〃	〃	6.10	7.8	16.3	96.2	18.1	1092.1	28.0	56.5
16	〃	24	5	〃	〃	6.12	7.10	15.8	100.1	19.5	884.8	27.2	56.2
17	〃	〃	6	〃	〃	6.12	7.10	16.2	102.3	18.6	907.2	27.8	56.2
18	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.8	17.9	102.8	18.4	1002.4	27.4	56.8
19	〃	〃	8	〃	〃	6.10	7.8	18.8	99.1	17.6	1052.8	27.2	56.8
20	〃	〃	9	〃	〃	6.10	7.8	19.6	99.3	18.5	1097.6	28.0	57.5

備考　籾重量指数ハ6合播株間200cm一株苗数

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄					米	籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3630.2	6173.9	3025.2	23.6	80.6	94.0	4.0	2.0	良	91.2
3907.6	6843.3	3529.4	23.2	81.3	95.0	4.0	1.0	〃	98.1
4285.7	7239.4	3529.4	23.4	82.0	94.0	5.0	1.0	〃	107.6
4084.0	6981.2	4033.6	24.0	81.3	93.0	2.0	5.0	〃	102.6
4260.5	7160.5	4033.6	24.4	81.3	97.0	2.0	1.0	〃	107.0
3981.3	6888.0	3500.0	23.4	81.3	94.0	5.0	1.0	〃	100.0
4200.0	7304.3	3500.0	23.2	81.3	97.0	2.0	1.0	稍良	105.5
4550.0	7777.8	3937.5	23.2	80.6	92.0	5.0	3.0	中上	114.3
4593.8	7933.9	4375.0	23.8	81.3	94.0	5.0	1.0	稍良	115.4
4593.8	7906.6	4375.0	23.2	81.3	91.0	8.0	1.0	中上	115.4
4222.0	7266.8	3588.7	22.8	80.6	93.0	6.0	1.0	〃	106.0
4369.8	7521.1	4855.3	23.6	82.0	95.0	3.0	2.0	〃	109.8
4454.2	7841.9	4644.2	23.2	80.6	92.0	6.0	2.0	稍良	111.9
4686.4	8150.3	4433.1	23.4	82.0	93.0	6.0	1.0	〃	117.7
4517.5	7995.6	4222.0	24.0	81.3	91.0	7.0	2.0	〃	113.5
3984.8	7090.3	4235.0	22.8	81.3	90.0	7.0	3.0	中上	100.1
4331.3	7706.9	4427.5	23.6	81.3	84.0	15.0	1.0	〃	108.8
4523.8	7964.3	4427.5	23.2	81.3	93.0	5.0	2.0	〃	113.6
4273.5	7523.8	3850.0	23.0	81.3	92.0	6.0	2.0	稍良	107.3
4331.3	7532.6	3850.0	23.2	82.0	94.0	4.0	2.0	〃	108.8

3本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第六表　（B）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	一ヘクトル当リ重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	8	18	3	1.30	3.28	6.12	7.10	9.5	97.4	18.8	950.0	27.2	55.6
2	〃	〃	4	〃	〃	6.12	7.10	10.3	96.6	18.8	1030.0	28.0	57.1
3	〃	〃	5	〃	〃	6.12	7.10	11.5	95.5	18.0	1150.0	27.6	56.8
4	〃	〃	6	〃	〃	6.10	7.8	11.7	94.3	17.7	1170.0	28.0	56.5
5	〃	〃	7	〃	〃	6.10	7.8	12.2	95.9	18.0	1220.0	28.0	57.1
6	〃	20	5	〃	〃	6.10	7.8	13.0	97.8	18.6	1053.0	27.2	57.1
7	〃	〃	6	〃	〃	6.11	7.9	13.2	99.2	18.4	1069.2	27.4	58.1
8	〃	〃	7	〃	〃	6.11	7.9	14.3	98.3	18.3	1158.3	27.4	56.8
9	〃	〃	8	〃	〃	6.11	7.9	13.3	96.4	17.5	1077.3	27.6	57.5
10	〃	〃	9	〃	〃	6.10	7.8	14.2	95.9	17.5	1150.2	27.4	57.5
11	〃	22	6	〃	〃	6.12	7.10	15.0	97.9	18.1	1005.0	27.0	57.1
12	〃	〃	7	〃	〃	6.12	7.10	14.0	96.7	17.1	938.0	27.6	57.1
13	〃	〃	8	〃	〃	6.12	7.10	16.1	94.4	18.1	1078.7	27.8	57.1
14	〃	〃	9	〃	〃	6.10	7.8	15.5	96.2	17.8	1038.5	27.6	57.5
15	〃	〃	10	〃	〃	6.11	7.8	17.2	96.9	17.6	1152.4	27.6	56.5
16	〃	24	7	〃	〃	6.12	7.10	17.2	99.5	18.6	963.2	27.0	55.9
17	〃	〃	8	〃	〃	6.12	〃	17.4	98.4	18.0	974.4	27.0	56.8
18	〃	〃	9	〃	〃	6.12	〃	16.9	98.4	18.1	946.4	27.2	57.5
19	〃	〃	10	〃	〃	6.12	〃	19.1	98.0	17.8	1069.6	27.0	57.1
20	〃	〃	11	〃	〃	6.12	〃	17.7	95.3	17.3	991.2	27.0	56.5

備考　籾重量指数ハ８合播株間２０cm　一株苗数

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄					米	籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4336.1	7798.8	3781.5	23.2	81.3	91.0	7.0	2.0	稍良	101.7
4411.8	7726.4	4033.6	23.4	80.6	92.0	4.0	4.0	良	103.4
4411.8	7767.2	4033.6	23.4	82.0	90.0	8.0	2.0	〃	103.4
4310.9	7629.9	5042.0	23.8	81.3	96.0	3.0	1.0	〃	101.1
4638.6	8123.7	4537.8	23.8	80.6	94.0	4.0	2.0	〃	108.7
4265.6	7470.4	4593.8	23.2	81.3	91.0	7.0	2.0	稍良	100.0
4265.6	7341.9	4593.8	23.2	82.0	92.0	6.0	2.0	良	100.0
4484.4	7895.0	4375.0	23.4	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	105.1
4309.4	7494.6	4375.0	23.4	80.6	91.0	7.0	2.0	稍良	101.0
4375.0	7608.7	4812.5	23.2	80.6	92.0	4.0	4.0	〃	102.6
4369.8	7652.8	3799.8	23.0	80.6	90.0	8.0	2.0	〃	102.4
4222.0	7394.0	3799.8	23.2	80.2	90.0	7.0	3.0	〃	99.0
4179.8	7319.6	4222.0	23.0	80.6	92.0	7.0	1.0	〃	98.0
4137.6	7195.8	4433.1	24.4	81.3	94.0	5.0	1.0	〃	97.0
4454.2	7883.6	4222.0	23.0	82.0	92.0	6.0	2.0	良	104.4
4215.8	7541.6	4427.5	22.8	80.0	87.0	11.0	2.0	〃	98.8
4042.5	7117.1	4042.5	22.8	80.6	92.0	7.0	1.0	〃	94.8
3875.4	6737.9	3593.1	22.8	80.6	91.0	5.0	4.0	〃	90.0
4138.8	7248.2	4235.0	23.0	80.6	86.0	7.0	7.0	稍良	97.0
3965.5	7018.6	3850.0	23.0	80.6	91.0	3.0	6.0	〃	93.0

５本植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第七表 (B′)

標準肥料倍量區

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	1.31	3.30	6.20	7.20	12.2	108.3	20.9	1220.0	24.0	54.3
2	〃	〃	3	〃	〃	6.19	7.19	12.2	105.4	20.7	1220.0	24.0	54.9
3	〃	〃	4	〃	〃	6.19	7.19	13.6	100.8	19.2	1360.0	24.0	54.6
4	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	15.0	103.3	19.7	1500.0	24.4	54.3
5	〃	20	2	〃	〃	6.19	7.19	13.6	103.8	20.4	1101.6	23.8	54.1
6	〃	〃	3	〃	〃	6.19	7.19	14.5	104.1	20.3	1174.5	24.0	54.9
7	〃	〃	4	〃	〃	6.19	7.19	14.2	103.2	19.4	1150.2	24.4	54.3
8	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	15.1	99.9	19.2	1223.1	23.6	55.9
9	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	14.7	102.8	19.1	1190.7	24.4	54.3
10	〃	22	3	〃	〃	6.19	7.19	16.7	105.4	20.0	1118.9	23.4	55.6
11	〃	〃	4	〃	〃	6.20	7.20	17.3	105.9	19.2	1159.1	24.0	53.8
12	〃	〃	5	〃	〃	6.20	7.20	16.5	102.7	19.5	1105.5	24.2	54.1
13	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	16.8	103.4	18.7	1125.6	23.6	54.1
14	〃	〃	7	〃	〃	6.19	7.19	17.3	107.0	19.2	1159.1	24.2	53.5
15	〃	24	4	〃	〃	6.20	7.20	17.5	105.0	20.0	980.0	24.4	54.3
16	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	19.5	106.2	19.1	1092.0	23.6	54.9
17	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	18.9	105.0	19.1	1058.4	23.8	53.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.19	7.19	18.6	100.6	20.1	1041.6	23.2	55.9
19	〃	〃	8	〃	〃	6.19	7.19	21.6	103.9	19.5	1209.6	23.4	54.3

備考　籾重量指数ハ標準區4合播株間20糎一株

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクタール重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3044.2	5606.3	4459.7	20.0	80.0	85.0	7.0	8.0	中下	71.5
3141.2	5721.6	4265.8	19.4	80.0	88.0	3.0	9.0	〃	73.8
2481.9	4545.6	4071.9	19.8	80.6	87.0	3.0	10.0	〃	58.3
2927.9	5392.1	4071.9	19.8	80.6	90.0	2.0	8.0	中	68.7
2603.3	4812.0	3913.5	19.0	80.6	91.0	2.0	7.0	〃	61.1
3147.8	5733.7	4594.1	19.8	80.0	91.0	4.0	5.0	〃	73.9
3386.0	6235.7	3062.7	19.8	80.6	90.0	3.0	7.0	〃	79.5
2756.4	4931.0	4253.8	19.4	80.6	88.0	3.0	9.0	〃	64.7
2892.6	5327.0	4764.2	19.8	81.3	88.0	2.0	10.0	〃	67.9
3378.0	6075.5	5404.8	19.6	80.6	87.0	4.0	9.0	〃	79.3
3327.3	6184.6	5235.9	20.0	80.6	89.0	3.0	8.0	〃	78.1
3394.9	6275.2	5404.8	19.8	80.0	91.0	3.0	6.0	〃	79.7
3057.1	5650.8	3040.2	19.4	80.6	89.0	2.0	9.0	中上	71.8
3394.9	6345.6	4898.1	19.6	80.6	88.0	2.0	10.0	中	79.7
3089.9	5690.5	5176.1	20.0	81.3	86.0	4.0	10.0	〃	72.6
3042.9	5542.6	4391.8	19.4	80.6	91.0	2.0	7.0	〃	71.4
3089.9	5743.4	4548.7	19.0	80.6	89.0	1.0	10.0	中下	72.6
2744.9	4910.3	4548.7	19.2	80.6	89.0	3.0	8.0	〃	64.5
3011.5	5546.1	5019.2	18.6	80.6	93.0	1.0	6.0	中	70.7

苗数3本植区1ヘクタール当4258.8Kgヲ標準トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第八表（6）

標準區

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫當時 穗数	草丈	穗長	坪當穗数	千粒重量	ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	1.31	3.28	6.10	7.8	8.3	101.0	19.1	830.0	28.0	57.5
2	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	9.3	99.0	18.5	930.0	28.0	57.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	10.1	99.1	18.6	1010.0	28.4	56.8
4	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	11.2	98.6	18.4	1120.0	27.8	56.8
5	〃	20	2	〃	〃	6.13	7.10	9.5	103.9	19.5	769.5	27.2	55.6
6	〃	〃	3	〃	〃	6.10	7.8	10.4	101.9	19.2	842.4	28.2	56.8
7	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	11.7	100.8	19.0	947.7	27.8	57.1
8	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	13.2	100.1	18.7	1069.2	28.2	56.5
9	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	13.9	101.4	18.2	1125.9	28.0	56.5
10	〃	22	3	〃	〃	6.13	7.10	12.1	103.9	19.0	810.7	27.2	57.1
11	〃	〃	4	〃	〃	6.10	7.8	12.5	100.5	19.1	837.5	27.8	57.5
12	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	15.1	99.8	18.4	1011.7	27.6	57.1
13	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	15.4	100.3	17.9	1031.8	27.6	57.5
14	〃	〃	7	〃	〃	6.8	7.6	16.3	100.0	17.7	1092.1	27.4	56.8
15	〃	24	4	〃	〃	6.9	7.7	15.4	101.5	19.3	862.4	27.4	57.5
16	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	16.9	99.8	18.7	946.4	27.2	57.1
17	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	18.3	105.5	19.1	1024.8	27.4	57.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.9	7.7	18.2	104.6	18.9	1019.2	27.4	56.5
19	〃	〃	8	〃	〃	6.9	7.7	17.4	100.3	18.3	974.4	28.0	57.1

備考　籾重量指数ハ標準區ヲ合播株間20cm一

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3898.8	6780.5	3529.1	23.4	82.0	92.0	6.0	2.0	稍良	91.5
4436.5	7715.7	3697.1	23.6	82.6	93.0	5.0	2.0	〃	104.2
4402.9	7751.6	3529.1	24.0	82.0	90.0	5.0	5.0	〃	103.4
4923.9	8668.8	4537.4	23.4	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	115.6
4229.7	7607.3	3938.0	23.0	80.6	86.0	13.0	1.0	〃	99.3
4258.8	7497.9	3500.4	23.6	81.3	93.0	5.0	2.0	〃	100.0
4375.0	7662.0	4250.0	23.8	82.0	90.0	6.0	4.0	〃	102.7
4462.5	7898.2	4750.0	23.8	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	104.8
4637.5	8208.0	4250.0	23.6	81.3	91.0	7.0	2.0	中上	108.9
4532.2	7937.2	3941.0	23.0	82.0	89.0	9.0	2.0	〃	106.4
4335.1	7539.3	3669.5	23.4	82.0	90.0	7.0	3.0	〃	101.8
4560.3	7986.5	4222.5	23.2	82.6	94.0	3.0	3.0	稍良	107.1
4377.3	7612.7	4504.0	23.2	82.6	93.0	5.0	2.0	〃	102.8
4391.4	7731.3	5348.5	23.2	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	103.1
4286.9	7455.5	4107.2	22.8	82.6	93.0	4.0	3.0	中上	100.7
4338.2	7597.6	5262.4	23.2	82.6	92.0	5.0	3.0	〃	101.9
4453.7	7705.4	3080.4	23.4	81.3	94.0	3.0	3.0	〃	104.6
4479.4	7928.2	4107.2	23.0	82.0	96.0	1.0	4.0	〃	105.2
3876.2	6788.4	4363.9	23.8	82.6	96.0	3.0	1.0	稍良	91.0

株苗数3本植區一ヘクタール当4258.8KgヲΒ標準トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第九表 (b)

深植試験區

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	收穫当時 草丈	收穫当時 穂長	收穫当時 坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	1.31	3.28	6.9	7.7	8.3	100.7	18.6	830.0	27.6	57.1
2	〃	〃	3	〃	〃	6.8	7.6	10.0	97.5	18.4	1000.0	27.8	56.8
3	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.6	11.6	96.4	18.0	1160.0	27.4	56.8
4	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.6	12.3	97.0	17.6	1230.0	28.2	57.8
5	〃	20	2	〃	〃	6.11	7.9	9.8	101.2	19.3	793.8	27.4	57.1
6	〃	〃	3	〃	〃	6.10	7.8	11.0	101.3	18.7	891.0	27.2	56.8
7	〃	〃	4	〃	〃	6.10	7.8	12.3	99.7	18.2	996.3	28.2	56.8
8	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	13.6	98.0	17.4	1101.6	28.2	57.1
9	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	13.9	97.8	17.6	1125.9	28.0	57.1
10	〃	22	3	〃	〃	6.11	7.9	12.0	101.0	18.4	804.0	27.8	57.1
11	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	13.8	100.9	18.1	924.6	27.8	56.8
12	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	14.6	97.8	17.5	978.2	28.0	58.1
13	〃	〃	6	〃	〃	6.7	7.6	15.8	97.9	17.9	1058.6	28.2	59.2
14	〃	〃	7	〃	〃	6.7	7.6	16.2	94.8	18.0	1085.4	28.2	58.1
15	〃	24	4	〃	〃	6.9	7.7	14.6	100.1	19.4	817.6	28.0	58.5
16	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	15.7	98.1	18.2	879.2	28.2	58.1
17	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	16.9	97.0	18.6	946.4	28.2	57.1
18	〃	〃	7	〃	〃	6.7	7.6	17.8	94.8	17.9	996.8	28.2	58.1
19	〃	〃	8	〃	〃	6.7	7.6	18.6	94.3	17.8	1041.6	28.2	58.1

備考 粒重量指数ハ標準區4合播株間20cm 3本植區

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄					米	籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4100.4	7187.1	3361.0	23.6	80.6	96.0	2.0	2.0	良	96.3
4588.2	8077.9	4537.8	23.4	81.3	97.0	1.0	2.0	〃	107.7
4739.5	8344.2	4033.6	23.2	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	111.3
4739.5	8199.8	4537.8	23.8	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	111.3
4112.5	7202.3	3500.0	23.4	82.0	95.0	2.0	3.0	稍良	96.6
3893.8	6855.2	3500.0	23.0	81.3	95.0	3.0	2.0	〃	91.4
4003.1	7047.8	3937.5	23.4	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	94.0
4287.5	7508.8	4375.0	24.0	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	100.7
4221.9	7393.8	3500.0	23.6	81.3	96.0	2.0	2.0	〃	99.1
4306.4	7541.9	3377.6	23.2	81.3	97.0	1.0	2.0	良	101.1
4264.2	7507.4	4433.1	23.8	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	100.1
4285.3	7375.8	3799.8	23.2	81.3	97.0	0	3.0	〃	100.6
4348.7	7345.7	3799.8	23.8	82.0	95.0	1.0	4.0	〃	102.1
4475.3	7702.8	3799.8	23.8	81.3	97.0	0	3.0	稍良	105.1
4061.8	6943.2	4235.0	23.6	82.0	96.0	2.0	2.0	良	95.4
3965.5	6825.3	3468.0	23.8	82.6	97.0	1.0	2.0	〃	93.1
4138.8	7248.2	3465.0	24.0	81.3	98.0	0	2.0	〃	97.2
3907.8	6725.9	3465.0	24.2	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	91.8
4215.8	7256.0	3465.0	23.8	82.0	94.0	2.0	4.0	〃	99.0

一ヘクタール当4258.8Kgヲ標準トセリ

第拾表・(5)

洗根試験區

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	1.31	3.30	6.11	7.9	8.6	99.5	18.3	860.0	27.2	56.8
2	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	9.2	96.3	17.4	920.0	28.2	57.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	9.9	90.1	17.5	990.0	28.4	57.1
4	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.6	10.4	92.2	16.8	1040.0	28.4	58.1
5	〃	20	2	〃	〃	6.9	7.7	8.4	98.1	18.6	680.4	28.4	58.1
6	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	9.9	96.4	18.4	801.9	28.4	58.5
7	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.6	10.8	92.8	17.3	874.8	28.4	57.5
8	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.6	11.5	95.2	17.4	931.5	28.4	59.2
9	〃	〃	6	〃	〃	6.8	7.6	12.0	93.6	17.2	972.0	27.6	57.5
10	〃	22	3	〃	〃	6.11	7.9	10.5	97.9	19.4	703.5	27.6	58.1
11	〃	〃	4	〃	〃	6.11	7.9	11.6	96.2	17.9	777.2	27.6	57.1
12	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	12.8	95.7	17.6	857.6	28.0	57.5
13	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	13.7	94.7	18.0	917.9	27.8	57.8
14	〃	〃	7	〃	〃	6.8	7.6	13.5	89.8	16.8	904.5	28.2	57.5
15	〃	24	4	〃	〃	6.11	7.9	13.3	96.8	18.2	744.8	27.8	57.1
16	〃	〃	5	〃	〃	6 11	7.9	14.3	97.8	17.6	800.8	27.8	57.5
17	〃	〃	6	〃	〃	6 11	7.9	15.1	95.7	18.4	845.6	27.8	57.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.11	7.9	17.4	100.6	18.3	974.4	27.4	57.1
19	〃	〃	8	〃	〃	6.11	7.9	18.3	100.3	17.7	1024.8	27.4	57.5

備考 籾重量指数ハ標準區4合播株間20cm 3本

籾		一ヘクタール当藁重量	玄				米		籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4302.1	7607.0	3697.1	23.0	82.0	97.0	2.0	1.0	中上	101.0
4033.2	7014.3	3361.0	23.8	82.6	96.0	2.0	2.0	稍良	94.7
3848.3	6739.7	3865.2	23.8	82.6	97.0	2.0	1.0	〃	90.4
4134.0	7115.4	3697.1	23.8	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	97.1
3704.6	6376.2	3500.4	23.8	82.6	95.0	2.0	3.0	〃	87.0
3850.4	6581.9	3208.7	23.8	82.0	98.0	1.0	1.0	良	90.4
3602.5	6265.2	3208.7	23.8	82.6	97.0	1.0	2.0	〃	84.6
3544.2	5986.7	3500.4	24.0	82.6	96.0	1.0	3.0	稍良	83.2
3602.5	6265.2	3208.7	23.8	82.0	97.0	2.0	1.0	〃	84.6
3561.0	6129.0	2815.0	23.2	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	83.6
3589.1	6285.7	3237.3	23.2	82.0	98.0	1.0	1.0	良	84.3
3546.9	6168.5	3096.5	23.6	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	83.3
3378.0	5844.3	3378.0	23.6	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	79.3
3546.9	6168.5	3518.8	24.0	82.0	98.0	0	2.0	稍良	83.3
3452.6	6046.6	2952.1	23.6	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	81.1
3786.3	6584.9	3080.4	23.2	82.6	95.0	3.0	2.0	〃	88.9
3632.3	6284.3	2567.0	23.6	82.0	93.0	4.0	3.0	〃	85.3
4209.9	7372.8	3593.8	23.0	82.0	93.0	5.0	2.0	中上	98.9
4351.1	7567.1	4235.6	23.8	82.0	94.0	5.0	1.0	〃	102.2

植區1ヘクタール当4258.8Kgヲ標準トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾壹表（C）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時					
								穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	1.31	4.8	6.21	7.21	9.3	102.4	21.0	930.0	25.2	54.1
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	10.7	101.4	19.3	1070.0	25.6	54.9
3	〃	〃	4	〃	〃	6.19	7.19	10.6	100.5	19.3	1060.0	26.2	57.1
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	11.5	98.5	19.0	1150.0	26.4	55.9
5	〃	20	2	〃	〃	6.21	7.21	9.6	97.7	19.8	777.6	26.2	55.9
6	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	11.0	97.7	18.7	891.0	25.6	56.2
7	〃	〃	4	〃	〃	6.20	7.20	11.2	97.0	19.9	907.2	26.0	55.6
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.1	98.2	18.2	980.1	26.0	57.5
9	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	13.3	99.0	17.7	1077.3	26.2	56.2
10	〃	22	3	〃	〃	6.21	7.21	13.4	103.0	19.9	897.8	25.2	54.3
11	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	13.8	99.5	19.3	924.6	25.8	54.1
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.5	98.4	17.9	1038.5	25.6	54.6
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.5	99.6	20.0	1105.5	25.0	54.1
14	〃	〃	7	〃	〃	6.20	7.20	16.6	102.2	18.0	1112.2	25.0	53.8
15	〃	24	4	〃	〃	6.21	7.21	16.6	100.3	19.4	929.6	24.8	54.1
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	16.5	99.2	19.4	924.0	25.6	55.2
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	17.5	97.6	18.4	980.0	24.8	54.1
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.6	99.4	19.4	1097.6	24.6	54.1
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	20.4	96.9	18.7	1142.4	25.4	54.3

備考 粒重量指数ハ 4 合播株間 20cm 一株苗数 3

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
3208.1	5929.9	3437.3	20.8	81.3	88.0	4.0	8.0	中下	96.4
3597.7	6553.1	3437.3	21.0	80.0	91.0	2.0	7.0	〃	108.1
3872.6	6782.2	3666.4	21.6	82.0	97.0	1.0	2.0	中	116.3
4239.3	7583.7	3895.6	22.2	80.6	94.0	1.0	5.0	〃	127.4
3389.7	6063.9	3063.0	21.6	81.3	94.0	2.0	4.0	中下	101.8
3328.5	5922.5	3267.2	21.4	80.6	93.0	2.0	5.0	中	100.0
4124.8	7418.8	3675.6	21.8	80.6	91.0	3.0	6.0	〃	123.9
3900.2	6783.0	3675.6	21.6	82.0	90.0	2.0	8.0	〃	117.2
4104.4	7303.2	3879.8	21.8	82.0	94.0	3.0	3.0	中上	123.3
3335.4	6142.5	3799.8	21.2	81.3	93.0	1.0	6.0	中下	100.2
3528.5	6522.2	3619.0	21.4	80.6	91.0	3.0	6.0	〃	106.0
3474.2	6363.1	3257.1	21.4	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	104.4
3347.6	6187.8	3800.0	21.0	80.6	93.0	3.0	4.0	〃	100.6
3347.6	6222.3	4161.9	21.0	80.6	94.0	2.0	4.0	〃	100.6
2629.1	4859.7	3176.1	20.4	80.6	92.0	3.0	5.0	〃	97.0
3070.2	5562.0	3176.1	21.0	80.0	91.0	4.0	5.0	〃	92.2
2982.0	5512.0	3529.0	20.8	80.6	90.0	3.0	7.0	〃	89.6
2946.7	5446.8	3529.0	20.2	80.6	90.0	3.0	7.0	〃	88.5
2929.1	5394.2	3705.5	21.0	80.0	87.0	2.0	1.0	〃	88.0

本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾貳表 (D)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫當時 穂数	収穫當時 草丈	収穫當時 穂長	収穫當時 坪當穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	2.10	3.30	6.11	7.9	9.5	104.5	18.5	950.0	26.4	54.9
2	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	11.5	106.8	18.3	1150.0	26.4	55.6
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.1	105.3	17.6	1210.0	27.0	54.6
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.9	104.3	17.4	1390.0	26.2	54.3
5	〃	20	2	〃	〃	6.11	7.9	11.4	107.4	18.7	923.4	26.0	54.6
6	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	14.6	109.6	19.4	1182.6	26.0	53.5
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	15.2	108.4	18.0	1231.2	26.8	55.6
8	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	15.7	108.2	17.6	1271.7	27.2	54.9
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.4	108.2	18.8	1328.4	26.6	54.9
10	〃	22	3	〃	〃	6.11	7.9	13.3	108.7	19.1	891.1	26.2	54.9
11	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	15.0	109.3	18.9	1005.0	26.2	54.3
12	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	15.6	107.1	17.8	1045.2	26.2	53.8
13	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	19.2	106.7	18.2	1286.4	27.2	55.2
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.7	105.2	17.8	1386.9	26.8	54.6
15	〃	24	4	〃	〃	6.11	7.9	17.5	107.2	19.4	980.0	26.8	55.9
16	〃	〃	5	〃	〃	6.10	7.8	18.3	106.1	19.1	1036.0	26.4	55.9
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	18.4	105.1	18.1	1030.4	26.8	55.9
18	〃	〃	7	〃	〃	6.11	7.9	20.6	106.4	16.8	1153.6	27.2	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	6.9	7.7	23.2	106.2	17.6	1299.2	26.4	56.5

備考 籾重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数3

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄					米	籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリツトル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4335.7	7897.4	4033.2	22.2	82.0	91.0	6.0	3.0	中上	91.8
4335.7	7798.0	5041.5	22.2	81.0	93.0	4.0	3.0	中	91.8
4234.9	7756.2	5041.5	22.4	80.5	91.0	4.0	5.0	〃	89.6
5142.3	9470.2	5545.7	22.2	80.6	87.0	7.0	6.0	〃	108.8
3281.6	6010.3	4375.5	21.8	82.6	92.0	8.0	2.0	〃	69.4
4725.5	8832.8	5250.6	22.0	82.0	89.0	6.0	5.0	〃	100.0
4638.0	8329.5	4375.5	22.2	82.0	87.0	9.0	4.0	〃	98.1
4638.0	8448.1	5250.6	22.8	82.6	94.0	4.0	2.0	〃	98.1
4944.3	9006.0	4813.1	22.0	82.0	92.0	5.0	3.0	〃	104.6
4433.6	8075.8	4222.5	22.2	82.0	94.0	4.0	2.0	〃	93.8
4729.2	8709.4	5067.0	22.2	81.3	92.0	4.0	4.0	中上	100.1
4475.9	8319.4	5067.0	22.0	82.6	93.0	4.0	3.0	〃	94.7
4982.6	9026.4	5067.0	22.8	81.3	90.0	5.0	5.0	〃	105.4
4379.0	8020.1	5066.6	22.2	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	92.7
4312.0	7713.8	4235.0	22.4	81.3	94.0	3.0	3.0	〃	91.2
4697.0	8402.5	3850.0	22.4	81.3	90.0	6.0	4.0	〃	99.4
4543.0	8127.0	3850.0	22.8	82.0	92.0	3.0	5.0	〃	96.1
4774.0	8494.7	4620.0	22.8	82.6	95.0	3.0	2.0	〃	101.0
5351.5	9471.7	5390.0	22.4	82.0	94.0	5.0	1.0	〃	113.2

本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

第一期作

標準肥料區

苗代日数ニ関スル調査成績

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第一期作

標準肥料區　　第一表 (a)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	6	18	2	1.20	3.14	6.8	7.8	8.0	97.2	18.1	800.0	29.4	58.1
2	〃	〃	3	〃	〃	6.8	7.8	9.2	94.8	18.0	920.0	29.4	57.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.8	10.4	94.4	16.9	1040.0	28.2	55.6
4	〃	〃	5	〃	〃	6.7	7.7	12.0	96.6	17.4	1200.0	29.6	57.8
5	〃	〃	6	〃	〃	6.6	7.6	12.9	93.8	17.5	1290.0	28.8	58.1
6	〃	20	3	〃	〃	6.8	7.8	9.5	95.1	17.8	769.5	30.4	59.2
7	〃	〃	4	〃	〃	6.7	7.7	10.7	95.6	17.4	866.7	29.8	57.8
8	〃	〃	5	〃	〃	6.6	7.6	12.3	90.8	17.5	996.3	29.4	57.8
9	〃	〃	6	〃	〃	6.6	7.7	11.0	88.5	16.6	891.0	29.8	57.8
10	〃	〃	7	〃	〃	6.6	7.6	13.3	91.5	17.7	1077.3	30.2	57.1
11	〃	22	4	〃	〃	6.6	7.6	12.3	95.1	17.4	824.1	29.4	55.9
12	〃	〃	5	〃	〃	6.6	7.6	13.2	90.6	16.7	884.4	30.0	57.5
13	〃	〃	6	〃	〃	6.5	7.5	14.3	90.8	17.0	958.1	30.2	56.8
14	〃	〃	7	〃	〃	6.5	7.5	13.7	93.3	16.7	917.9	30.2	56.8
15	〃	〃	8	〃	〃	6.5	7.5	16.1	90.4	16.4	1078.7	30.4	55.6
16	〃	24	5	〃	〃	6.5	7.5	138	93.4	17.4	772.8	30.0	58.1
17	〃	〃	6	〃	〃	6.5	7.5	15.1	91.4	16.6	845.6	29.8	55.6
18	〃	〃	7	〃	〃	6.5	7.5	15.3	89.3	17.1	856.8	29.8	55.9
19	〃	〃	8	〃	〃	6.5	7.5	16.4	88.2	16.7	918.4	29.8	55.6
20	〃	〃	9	〃	〃	6.5	7.5	16.4	90.6	16.6	918.4	30.4	55.9

備考　粒重量指数ハ 6 合播株間 20cm / 株苗数 3 本

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4638.2	7983.1	3024.9	24.6	80.6	97.0	2.0	1.0	良	116.5
4638.2	8066.4	4033.2	25.4	80.0	96.0	3.0	1.0	〃	116.5
4587.8	8251.4	3529.1	24.0	79.4	92.0	7.0	1.0	稍良	115.2
4839.8	8373.4	5545.7	24.8	80.6	93.0	3.0	4.0	〃	121.6
5344.0	9197.9	4033.2	24.6	81.3	97.0	1.0	2.0	〃	134.2
3981.7	6725.9	4375.5	25.6	80.6	95.0	4.0	1.0	良	100.0
4113.0	7115.9	3062.9	25.0	80.0	96.0	2.0	2.0	〃	103.3
4220.5	7267.3	4375.5	25.2	80.6	96.0	1.0	3.0	〃	105.5
3719.2	6434.6	3938.0	25.2	80.0	95.0	2.0	3.0	〃	93.4
4463.0	7816.1	3938.0	25.4	80.6	95.0	0	5.0	〃	112.1
4095.8	7327.1	3800.3	24.8	80.6	94.0	1.0	5.0	〃	102.9
3969.2	6902.9	3378.0	25.6	80.6	93.0	1.0	6.0	〃	99.7
4011.4	7074.7	3378.0	25.4	80.0	96.0	1.0	3.0	〃	100.7
3715.8	6541.9	2955.8	25.6	80.0	96.0	0	4.0	〃	93.3
4264.7	7670.4	4222.5	25.6	80.0	93.0	2.0	5.0	〃	107.1
3696.0	6361.4	3465.0	25.4	80.0	97.0	1.0	2.0	〃	92.8
3426.5	6162.8	3080.0	25.4	80.6	94.0	1.0	5.0	〃	86.1
3542.0	6336.3	3465.0	25.4	79.4	95.0	0	5.0	〃	89.0
3619.0	5699.8	3465.0	25.6	80.6	95.0	0	5.0	〃	90.9
3311.0	5923.1	3465.0	25.6	79.4	95.0	0	5.0	〃	83.2

標ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第 二 表 （a）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時				千粒重量	一ヘクトリットル重量
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数		
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	1.20	3.14	6.5	7.5	8.4	92.7	16.7	840.0	29.4	56.5
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	10.4	91.6	16.7	1040.0	29.4	57.1
3	〃	〃	5	〃	〃	6.6	7.6	10.7	90.4	16.4	1070.0	28.6	53.8
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	10.8	89.5	16.8	1080.0	29.0	57.1
5	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	12.0	91.7	16.0	1200.0	29.0	54.3
6	〃	20	5	〃	〃	〃	〃	12.4	92.7	17.5	1004.4	29.8	56.2
7	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	12.7	93.0	16.9	1028.7	29.8	56.8
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	12.3	90.5	17.0	996.3	29.4	56.8
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	13.9	90.5	16.4	1125.9	29.4	56.2
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	14.0	90.4	16.7	1134.0	30.2	55.9
11	〃	22	6	〃	〃	〃	〃	13.7	93.3	17.4	917.9	29.2	56.5
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.0	96.9	17.3	1005.0	28.4	57.5
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	14.6	92.8	17.3	978.2	28.4	56.5
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	16.2	95.5	16.5	1085.4	29.0	55.9
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	18.4	92.1	17.3	1232.8	28.8	57.1
16	〃	24	7	〃	〃	〃	〃	16.3	92.2	18.2	912.8	29.0	56.5
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.5	92.3	16.4	1092.0	29.8	56.8
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	15.1	92.3	17.0	845.6	29.4	55.2
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	16.1	91.0	17.1	901.6	29.6	56.2
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	21.5	96.7	18.1	1204.0	28.8	56.8

備考 粒重量指数ハ 8合播株間20cm一株苗数5本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾			玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3781.1	6692.3	3024.9	25.4	80.0	95.0	0	5.0	良	91.9
3932.4	6886.8	5041.5	24.8	78.9	93.0	0	7.0	〃	95.6
3932.4	7309.2	3024.9	24.4	80.4	88.0	1.0	11.0	稍良	95.6
4134.0	7240.0	3024.9	24.8	78.5	94.0	0	6.0	〃	100.5
3982.8	7334.8	5041.5	24.8	79.4	96.0	0	4.0	〃	96.8
4113.0	7318.5	3938.0	25.2	78.7	92.0	1.0	7.0	〃	100.0
3850.4	6778.9	3500.4	25.2	80.0	96.0	0	4.0	〃	93.6
3938.0	6933.0	5250.6	25.0	80.6	93.0	2.0	5.0	〃	95.7
4200.5	7474.2	2625.3	25.0	80.0	93.0	2.0	5.0	〃	102.1
4331.7	7749.1	4375.5	25.4	79.4	94.0	1.0	5.0	〃	105.3
3842.5	6800.8	3378.0	24.6	80.6	96.0	0	4.0	良	93.4
4138.1	7196.6	2533.5	24.2	80.6	93.0	0	7.0	稍良	100.6
3715.8	6576.6	4222.5	24.2	80.5	91.0	0	9.0	〃	90.3
4222.5	7553.7	4225.5	24.4	79.6	96.0	0	4.0	〃	102.7
4095.8	7173.1	4225.5	24.4	80.0	97.0	0	3.0	〃	99.6
3811.5	6746.0	3465.0	24.6	80.6	95.0	0	5.0	良	92.7
3850.0	6778.2	3080.0	25.0	80.0	95.0	0	5.0	〃	93.6
3465.0	6277.2	2310.0	24.6	80.0	93.0	0	7.0	稍良	84.2
3696.0	6576.5	3850.0	25.0	80.0	93.0	0	7.0	〃	89.9
4966.5	8743.8	3850.0	24.2	80.6	98.0	0	2.0	〃	120.8

植ヲ１００トセリ

第 三 表 （b）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫考時				千粒重量	ヘクタール重量
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数		
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	1.20	3.24	6.8	7.8	6.2	97.2	19.1	620.0	28.6	56.8
2	〃	〃	2	〃	〃	6.8	7.8	8.3	98.9	18.9	830.0	28.6	56.8
3	〃	〃	3	〃	〃	6.7	7.7	9.0	92.9	18.0	900.0	29.6	58.1
4	〃	〃	4	〃	〃	6.6	7.6	10.1	96.4	17.4	1010.0	29.6	58.5
5	〃	〃	5	〃	〃	6.5	7.5	11.1	95.6	17.2	1110.0	29.0	57.5
6	〃	20	2	〃	〃	6.8	7.8	10.1	101.1	18.1	818.1	28.2	55.6
7	〃	〃	3	〃	〃	6.7	7.7	11.5	99.5	18.1	931.5	28.0	56.8
8	〃	〃	4	〃	〃	6.7	7.7	12.5	96.8	18.1	1012.5	28.8	56.8
9	〃	〃	5	〃	〃	6.6	7.6	12.8	94.2	16.9	1036.8	28.4	55.6
10	〃	〃	6	〃	〃	6.6	7.6	14.2	93.6	17.4	1150.2	28.0	55.6
11	〃	22	3	〃	〃	6.7	7.7	13.5	100.4	18.4	904.5	28.0	56.8
12	〃	〃	4	〃	〃	6.6	7.6	13.5	100.9	18.6	904.5	28.2	57.1
13	〃	〃	5	〃	〃	6.6	7.6	14.2	95.9	17.5	951.4	29.0	58.1
14	〃	〃	6	〃	〃	6.5	7.5	15.6	94.5	17.2	1045.2	28.6	58.1
15	〃	〃	7	〃	〃	6.5	7.5	16.7	98.4	17.8	1118.9	29.0	56.8
16	〃	24	5	〃	〃	6.6	7.6	16.7	101.8	17.6	935.2	28.6	55.6
17	〃	〃	6	〃	〃	6.6	7.6	17.8	97.5	17.0	996.8	28.6	57.5
18	〃	〃	7	〃	〃	6.6	7.6	17.5	84.7	17.5	980.0	28.8	57.1
19	〃	〃	8	〃	〃	6.6	7.6	19.3	97.8	17.9	1080.8	28.6	56.8

備考 籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数3本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄				米		籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリツトル量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3886.1	6841.7	3025.1	24.6	81.3	98.0	0	2.0	稍良	90.2
4374.8	7702.0	3723.2	24.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	101.5
4025.7	6928.9	4188.6	25.2	82.0	96.0	1.0	3.0	良	93.4
4374.8	7478.2	3723.2	25.4	81.3	95.0	2.0	3.0	中上	101.5
4514.4	7851.9	4886.7	25.0	81.3	95.0	1.0	4.0	稍良	104.8
4104.4	7382.1	3879.8	24.0	80.6	93.0	4.0	3.0	〃	95.3
4308.6	7585.6	3879.8	24.0	80.6	95.0	1.0	4.0	良	100.0
4063.6	7154.2	4084.0	24.2	80.6	94.0	0	6.0	中上	94.3
3900.2	7014.8	49008	24.4	80.6	91.0	0	9.0	稍良	90.5
4206.5	7565.7	4900.8	24.0	80.6	93.0	0	7.0	〃	97.6
4256.7	7494.2	4256.7	23.8	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	98.8
3871.6	6780.3	3445.9	24.2	80.6	92.0	3.0	5.0	〃	89.9
3871.6	6663.6	4459.4	25.0	81.3	94.0	1.0	5.0	〃	89.9
3871.6	6663.6	4864.8	24.6	80.6	93.0	1.0	6.0	〃	89.9
4358.1	7672.6	5067.5	24.4	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	101.1
4272.1	7683.7	4705.0	24.6	80.6	93.0	1.0	7.0	〃	99.2
3876.9	6515.8	4516.8	24.6	82.0	94.0	0	6.0	良	90.0
3906.0	6840.6	4941.3	24.2	81.3	92.0	0.2	0.6	稍良	90.7
3694.2	6503.9	6117.8	24.6	81.3	95.0	0	5.0	〃	85.7

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第四表（b）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	1.20	3.24	6.8	7.8	8.4	101.2	18.3	840.0	27.2	57.1
2	〃	〃	3	〃	〃	6.8	7.8	10.4	97.2	17.8	1040.0	28.4	58.8
3	〃	〃	4	〃	〃	6.7	7.7	10.8	96.8	17.6	1080.0	28.8	58.1
4	〃	〃	5	〃	〃	6.7	7.7	11.4	93.5	16.5	1140.0	28.0	57.1
5	〃	20	2	〃	〃	6.10	7.10	9.4	100.8	17.4	761.4	28.0	56.5
6	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.9	11.4	102.6	17.7	923.4	27.6	57.1
7	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.8	13.0	96.9	17.9	1053.0	28.4	57.1
8	〃	〃	5	〃	〃	6.7	7.7	13.6	95.8	16.4	1101.6	28.8	57.8
9	〃	〃	6	〃	〃	6.7	7.7	14.6	95.5	17.2	1182.6	29.0	57.5
10	〃	22	3	〃	〃	6.8	7.8	11.9	105.1	18.3	797.3	28.6	56.8
11	〃	〃	4	〃	〃	6.8	7.8	13.3	97.9	18.5	891.1	28.2	58.1
12	〃	〃	5	〃	〃	6.8	7.8	14.9	96.9	17.7	998.3	29.0	56.8
13	〃	〃	6	〃	〃	6.8	7.8	15.7	96.8	17.7	1051.9	28.8	56.2
14	〃	〃	7	〃	〃	6.7	7.7	17.0	96.6	16.8	1139.0	28.4	57.5
15	〃	24	4	〃	〃	6.10	7.10	15.5	99.4	18.2	868.0	27.0	56.8
16	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.9	16.5	102.7	18.7	924.0	26.4	52.6
17	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.9	17.8	99.5	18.5	996.8	27.4	57.5
18	〃	〃	7	〃	〃	6.9	7.9	19.2	103.7	18.1	1075.2	28.6	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	6.8	7.8	19.8	98.4	18.1	1108.8	27.6	55.6

備考 籾重量指数ハ 4 合播株間 20cm 一株苗数 3 本

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリツトル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4072.3	7131.8	3955.9	23.8	80.0	95.0	2.0	3.0	中上	97.8
4235.1	7202.6	4421.3	24.0	80.6	92.0	4.0	4.0	〃	101.7
4142.1	7129.2	5119.4	24.4	80.6	92.0	4.0	4.0	〃	99.4
4049.0	7091.0	3955.9	24.0	80.6	91.0	4.0	5.0	〃	97.2
3859.4	6830.8	3675.6	23.6	80.0	87.0	9.0	4.0	〃	92.6
4165.7	7295.4	4900.8	23.4	80.6	92.0	4.0	4.0	稍良	100.0
4124.8	7223.9	4492.4	23.8	80.6	96.0	2.0	2.0	中上	99.0
4084.0	7065.7	4492.4	24.0	80.0	92.0	4.0	4.0	稍良	98.0
4165.7	7244.7	4900.8	24.2	80.6	91.0	4.0	5.0	〃	100.0
3810.8	6709.1	4054.0	24.0	80.6	89.0	6.0	5.0	中上	91.5
3972.9	6838.1	4054.0	23.8	80.6	95.0	3.0	2.0	良	95.4
4054.0	7137.3	4459.4	24.4	80.6	94.0	2.0	4.0	稍良	97.3
3972.9	7069.3	4864.8	24.0	80.0	91.0	4.0	5.0	良	95.4
4074.3	7085.7	4662.1	23.8	80.6	87.0	5.0	8.0	中上	97.8
3933.4	6925.0	4328.6	22.6	80.6	89.0	4.0	7.0	稍良	94.4
4065.1	7728.4	4140.4	22.0	81.3	92.0	4.0	4.0	〃	97.6
3971.0	6906.1	3952.2	23.2	81.3	93.0	3.0	4.0	〃	95.3
4159.2	7400.7	4516.8	23.8	81.3	89.0	7.0	4.0	〃	99.8
3989.8	7176.0	4705.0	23.0	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	95.8

植ヲ100トセリ

第五表（8）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫當時 穗数	收穫當時 草丈	收穫當時 穗長	收穫當時 坪當穗数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	6	18	2	1.20	3.24	6.10	7.8	8.6	98.8	18.2	860.0	26.2	54.1
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	10.9	102.3	18.2	1090.0	27.0	55.2
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.9	98.6	18.3	1290.0	27.4	55.6
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	11.8	94.1	16.9	1180.0	27.2	54.0
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.8	97.2	17.0	1380.0	28.2	54.6
6	〃	20	3	〃	〃	〃	〃	11.1	99.4	18.5	899.1	28.2	55.9
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.6	100.3	17.8	939.6	27.0	54.9
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.3	100.0	17.4	1239.3	27.0	54.9
9	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	13.5	97.5	17.3	1093.5	28.0	56.0
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.1	95.4	17.1	1304.1	28.4	56.5
11	〃	22	4	〃	〃	6.10	7.8	14.2	101.3	18.3	951.4	27.2	55.9
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.5	99.9	18.8	1038.5	27.2	56.2
13	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	16.7	97.5	18.3	1118.9	27.6	55.9
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.0	98.1	17.5	1139.0	27.6	55.9
15	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	18.3	97.1	17.7	1226.1	28.0	55.9
16	〃	24	5	〃	〃	6.10	7.8	17.4	99.3	18.5	974.4	27.4	54.3
17	〃	〃	6	〃	〃	6.10	〃	19.6	99.4	18.8	1097.6	27.4	55.2
18	〃	〃	7	〃	〃	6.9	7.7	21.0	102.2	17.6	1176.0	27.2	54.9
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	20.2	102.6	18.4	1131.2	28.2	55.2
20	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	21.0	101.4	18.0	1176.0	28.8	54.9

備考　籾重量指数ハ6合播株間20cm一株苗数3本

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3781.3	6989.4	4125.0	22.0	80.6	96.0	0	4.0	中上	99.6
4675.0	8469.2	4125.0	22.8	81.0	92.0	3.0	5.0	〃	123.1
4812.5	8655.6	4125.0	23.0	81.0	92.0	0	8.0	〃	126.7
4125.0	7638.9	4125.0	23.4	80.0	95.0	0	5.0	〃	108.6
5225.0	9569.6	4812.5	23.4	80.6	96.0	1.0	3.0	良	137.6
3797.8	6793.9	3062.8	23.4	81.3	96.0	0	4.0	稍良	100.0
4043.0	7364.3	3675.5	22.6	80.0	95.0	1.0	4.0	中上	106.5
4533.1	8256.9	3675.5	23.0	80.0	94.0	2.0	4.0	〃	119.4
3798.0	6982.1	3675.4	23.4	80.0	95.0	0	5.0	良	100.0
4594.1	8131.2	3675.3	23.6	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	121.0
4053.4	7251.2	3166.8	22.4	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	106.7
4965.7	8835.7	4053.6	22.8	81.3	95.0	1.0	4.0	稍良	130.8
4965.7	8883.1	5067.0	23.2	82.0	99.0	0	1.0	良	130.8
4661.6	8339.2	4053.6	23.4	81.3	94.0	1.0	5.0	〃	122.7
4954.4	8863.0	5067.0	23.4	80.6	95.0	0	5.0	〃	130.5
4423.2	8145.8	4235.0	22.8	82.0	93.0	2.0	5.0	稍良	116.5
4799.6	8694.9	4705.5	23.0	80.6	97.0	1.0	2.0	良	126.4
4987.8	9085.3	4705.5	22.8	82.0	94.0	3.0	3.0	〃	131.3
4987.8	9035.9	4705.5	23.4	81.3	97.0	0	3.0	〃	131.3
4658.4	8485.3	4235.0	24.0	82.6	93.0	2.0	5.0	〃	122.7

植ヲ１００トセリ

第　六　表　（乙）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫考査				千粒重量	ヘクトリットル重量
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数		
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	1.20	3.24	6.10	7.8	9.7	100.3	18.4	970.0	26.8	54.9
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.3	97.4	17.4	1130.0	28.0	54.1
3	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.5	95.3	17.3	1350.0	27.8	54.3
4	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	13.1	99.5	17.5	1310.0	28.0	55.2
5	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	12.2	94.3	17.1	1220.0	26.8	55.9
6	〃	20	5	〃	〃	6.10	7.8	13.9	98.9	18.1	1125.9	26.6	55.6
7	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	15.1	96.0	18.6	1223.1	27.2	55.6
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	14.8	96.7	17.7	1198.8	27.4	55.6
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	14.3	96.6	16.4	1158.3	27.2	55.6
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	15.5	94.5	17.0	1255.5	27.2	55.9
11	〃	22	6	〃	〃	〃	〃	13.9	99.2	18.7	931.3	27.2	55.6
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.4	97.6	17.3	1098.8	26.6	54.3
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	17.0	102.3	18.1	1139.0	27.0	55.9
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	15.6	93.6	17.3	1045.2	27.2	55.6
15	〃	〃	10	〃	〃	6.9	7.7	16.8	96.5	17.0	1125.6	27.4	55.9
16	〃	24	7	〃	〃	6.10	7.8	18.6	95.6	17.0	1041.6	27.6	56.8
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	14.9	95.8	17.5	834.4	27.2	55.9
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	18.1	93.2	18.0	1013.6	27.2	55.9
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	16.9	95.4	17.5	946.4	27.8	56.8
20	〃	〃	11	〃	〃	6.12	7.10	22.0	95.4	17.0	1232.0	27.0	55.9

備考　籾重量指数ハ8合播株間20cm１株苗数5本

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4600.5	8379.7	3781.2	22.6	81.3	91.0	2.0	7.0	中上	92.9
4537.4	8387.1	3781.2	23.4	80.0	92.0	2.0	6.0	〃	91.7
5419.7	9981.0	3781.2	23.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	109.5
5419.7	9818.3	5041.6	23.2	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	109.5
4726.5	8455.3	4411.4	22.4	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	95.5
4950.3	8903.4	3983.0	22.0	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	100.0
4677.8	8413.2	4455.0	22.8	80.5	94.0	4.0	2.0	〃	94.5
5123.3	9214.5	3341.3	23.2	81.3	95.0	3.0	2.0	稍良	103.5
4566.4	8212.9	4455.0	22.6	80.5	97.0	2.0	1.0	〃	92.2
4722.7	8448.5	3983.0	23.0	81.3	92.0	4.0	4.0	中上	95.4
4790.8	8616.5	4145.9	22.8	81.3	92.0	5.0	3.0	〃	96.8
4606.3	8482.9	3685.0	22.0	81.3	96.0	2.0	2.0	稍良	93.0
4514.3	8075.6	4606.3	22.8	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	91.2
4329.9	7787.5	3685.0	22.8	81.3	94.0	2.0	4.0	中上	87.5
4790.8	8570.2	4145.9	23.0	81.3	93.0	2.0	5.0	〃	96.8
4235.0	7456.0	3811.5	22.8	81.3	96.0	2.0	2.0	〃	85.6
4150.3	7424.5	4235.0	22.6	82.0	92.0	5.0	3.0	稍良	83.8
4235.0	7576.0	3388.0	22.8	82.0	97.0	2.0	1.0	〃	85.6
4192.7	7381.4	3811.5	23.0	82.0	96.0	2.0	2.0	中上	84.7
4277.4	7651.8	3811.5	22.8	81.3	96.0	2.0	2.0	〃	86.4

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第七表 (C)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	1.30	4.7	6.19	7.19	7.1	97.8	20.1	710.0	26.2	56.5
2	〃	〃	2	〃	〃	6.18	7.18	8.5	99.8	20.4	850.0	26.6	55.2
3	〃	〃	3	〃	〃	6.16	7.16	9.7	97.9	18.9	970.0	26.8	55.2
4	〃	〃	4	〃	〃	6.16	7.16	10.4	96.8	18.2	1040.0	26.2	55.9
5	〃	〃	5	〃	〃	6.16	7.16	11.1	95.8	18.8	1110.0	26.4	55.9
6	〃	20	2	〃	〃	6.19	7.19	10.1	98.8	20.5	818.1	26.0	55.2
7	〃	〃	3	〃	〃	6.19	7.19	11.5	97.0	19.3	931.5	26.4	57.5
8	〃	〃	4	〃	〃	6.18	7.18	12.1	98.8	19.0	980.1	25.6	54.9
9	〃	〃	5	〃	〃	6.17	7.17	12.8	96.6	19.3	1036.8	26.2	55.6
10	〃	〃	6	〃	〃	6.17	7.17	14.3	96.8	19.1	1158.3	26.2	55.6
11	〃	22	3	〃	〃	6.19	7.19	12.4	100.7	19.3	830.8	25.8	55.2
12	〃	〃	4	〃	〃	6.19	7.19	14.3	99.0	20.2	958.1	25.8	54.3
13	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	14.8	96.2	19.8	991.6	26.0	56.5
14	〃	〃	6	〃	〃	6.18	7.18	16.1	96.6	19.5	1078.7	26.8	57.5
15	〃	〃	7	〃	〃	6.18	7.18	16.7	96.5	17.8	1118.9	26.0	54.6
16	〃	24	5	〃	〃	6.20	7.20	15.5	97.6	19.9	868.0	26.2	56.5
17	〃	〃	6	〃	〃	6.20	7.20	16.3	96.3	20.1	912.8	26.2	55.2
18	〃	〃	7	〃	〃	6.19	7.19	16.5	95.1	19.5	924.0	26.6	56.8
19	〃	〃	8	〃	〃	6.18	7.18	17.3	93.4	18.5	968.8	26.2	55.2

備考 籾重量指数ハ 2合播株間 20cm 一株苗数 2本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリツトル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
3641.3	6410.7	2520.9	21.6	81.3	95.0	2.0	3.0	中上	99.8
2969.1	5378.7	2520.9	22.2	81.3	95.0	1.0	4.0	稍良	81.4
4257.5	7712.9	2240.8	22.2	80.6	94.0	3.0	3.0	〃	116.7
3837.4	6864.7	3361.2	21.8	81.3	93.0	1.0	6.0	〃	105.2
4145.5	7415.9	2801.0	22.2	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	113.6
3647.7	6608.1	3063.0	21.6	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	100.0
3452.8	6004.8	3619.9	22.0	80.6	93.0	2.0	5.0	中上	94.7
4148.9	7557.2	3898.3	21.4	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	113.7
4009.7	7211.7	2784.5	22.0	81.0	94.0	2.0	4.0	〃	109.9
4204.6	7562.2	3898.3	21.6	82.0	96.0	2.0	2.0	稍良	115.3
3462.5	6272.6	2815.0	21.0	80.6	90.0	4.0	6.0	中上	94.9
3884.7	7154.1	2252.0	21.2	80.6	93.0	3.0	4.0	〃	106.5
3997.3	7074.9	3378.0	21.6	81.3	97.0	1.0	2.0	稍良	109.6
4081.8	7098.7	3378.0	22.0	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	111.9
3990.4	7308.5	3167.0	21.4	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	109.4
3468.8	6139.5	2823.5	21.6	81.3	95.0	3.0	2.0	〃	95.1
3468.8	6284.1	3630.2	22.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	95.1
3751.2	6604.1	2016.8	22.0	82.0	94.0	1.0	5.0	〃	102.8
3660.3	6630.9	3327.5	22.0	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	100.3

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第八表（C）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	1.30	4.7	6.21	7.21	8.4	95.5	20.1	840.0	25.6	55.2
2	〃	〃	3	〃	〃	6.20	7.20	8.5	97.7	19.9	850.0	26.8	55.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	10.3	96.3	19.4	1030.0	25.8	55.2
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	11.1	94.3	19.1	1110.0	26.6	57.8
5	〃	20	2	〃	〃	6.23	7.23	9.6	96.0	18.7	777.6	26.4	56.8
6	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	11.4	95.7	18.7	923.4	25.4	56.5
7	〃	〃	4	〃	〃	6.21	7.23	11.9	94.4	18.8	963.9	26.0	57.5
8	〃	〃	5	〃	〃	6.20	7.20	12.4	93.4	17.2	1004.4	25.4	56.2
9	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	12.7	92.1	18.9	1028.7	26.0	57.5
10	〃	22	3	〃	〃	6.23	7.23	12.0	94.5	18.9	804.0	26.6	54.6
11	〃	〃	4	〃	〃	6.21	7.21	13.3	93.9	18.3	891.1	26.4	56.5
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	14.0	93.9	17.9	938.0	26.6	57.5
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.0	91.2	17.5	938.0	26.6	57.5
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.1	92.1	18.1	1011.7	26.4	55.6
15	〃	24	4	〃	〃	6.23	7.23	14.9	95.4	18.5	834.4	25.8	55.9
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.8	96.6	18.8	884.8	26.0	54.9
17	〃	〃	6	〃	〃	6.21	7.21	16.0	94.1	18.3	896.0	26.0	54.6
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.1	96.4	18.4	901.6	26.4	56.5
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	16.7	94.0	17.6	935.2	26.8	55.9

備考　粒重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数3本

籾			玄				米		籾重量
一ヘクタール當重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3767.5	6825.2	3300.0	21.0	80.6	94.0	2.0	4.0	中上	118.3
3767.5	6739.7	3850.0	22.0	80.6	95.0	1.0	4.0	〃	118.3
3932.5	7124.1	3575.0	21.6	81.3	93.0	2.0	5.0	〃	123.4
4125.0	7136.7	3575.0	22.0	81.3	97.0	1.0	2.0	稍良	129.5
3063.1	5392.8	2940.6	21.8	80.0	91.0	3.0	6.0	〃	96.2
3185.7	5638.3	3185.7	21.0	80.6	90.0	4.0	6.0	中上	100.0
2720.1	4730.5	2940.6	21.4	80.0	94.0	2.0	4.0	〃	85.4
3626.7	6453.3	3185.7	21.0	80.6	93.0	2.0	5.0	〃	113.8
3528.7	6136.9	3185.7	21.6	80.6	92.0	1.0	7.0	〃	110.8
3090.9	5660.9	3293.6	22.0	80.6	91.0	3.0	6.0	〃	97.0
3090.9	5470.6	3040.2	22.0	80.0	93.0	1.0	6.0	〃	97.0
3470.9	6036.3	3040.2	22.0	79.4	92.0	1.0	7.0	〃	109.0
3344.2	5816.0	3040.2	22.0	80.0	95.0	1.0	4.0	〃	105.0
3698.9	6652.8	3293.6	22.0	80.0	96.0	1.0	3.0	〃	116.1
3073.4	5498.0	3146.0	21.2	79.4	92.0	2.0	6.0	中	96.5
3194.4	5818.6	2662.0	21.4	78.7	92.0	2.0	6.0	〃	100.3
3170.2	5806.2	2662.0	21.4	79.4	92.0	3.0	5.0	〃	99.5
3460.6	6125.0	2662.0	21.8	80.0	93.0	3.0	4.0	〃	108.6
3301.4	5906.0	2419.9	22.2	80.0	92.0	2.0	6.0	〃	103.6

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第九表 (C)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	6	18	2	1.30	4.7	6.22	7.22	7.9	93.1	18.8	790.0	26.0	55.9
2	〃	〃	3	〃	〃	6.22	〃	8.9	92.9	18.2	890.0	26.0	56.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.21	7.21	9.5	92.7	17.2	950.0	26.6	57.5
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	9.8	89.0	16.7	980.0	27.0	56.2
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	11.6	91.0	17.2	1160.0	25.6	55.2
6	〃	20	3	〃	〃	6.25	7.25	14.4	97.3	18.5	1166.4	24.0	51.3
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	15.5	102.1	18.1	1255.5	24.8	54.1
8	〃	〃	5	〃	〃	6.24	7.24	15.6	98.2	18.4	1263.6	24.8	54.9
9	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	16.9	96.7	17.3	1368.9	25.0	56.2
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.5	98.7	18.8	1417.5	25.0	53.2
11	〃	22	4	〃	〃	6.25	7.22	16.2	98.1	18.6	1085.4	24.6	52.9
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	7.25	16.6	96.0	19.6	1112.2	24.4	55.2
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	17.3	95.4	19.9	1159.1	24.2	54.3
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.0	97.5	19.8	1273.0	24.0	55.2
15	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.5	97.6	19.7	1306.5	24.2	54.6
16	〃	24	5	〃	〃	〃	〃	19.3	95.8	18.8	1080.8	24.8	55.2
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.9	99.0	19.4	1114.4	24.4	54.3
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	21.8	97.9	19.1	1220.8	24.4	55.2
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	22.4	96.2	18.7	1254.4	24.6	55.9
20	〃	〃	9	〃	〃	6.23	7.23	21.4	97.2	19.4	1198.4	24.8	55.6

備考 粒重量指数ハ6合播株間20cm一株苗数3本.

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3092.1	5531.5	3361.0	21.8	80.0	91.0	2.0	7.0	中	126.2
3471.9	6144.9	2750.0	21.8	79.4	91.0	2.0	7.0	中上	141.7
3361.0	5845.2	2688.8	22.8	80.0	96.0	1.0	3.0	稍良	137.2
3389.2	6030.6	3361.2	22.4	80.0	93.0	2.0	5.0	〃	138.3
3193.1	5784.7	3361.2	21.0	78.7	92.0	1.0	7.0	中上	130.3
2450.5	4776.6	3920.8	20.0	78.7	84.0	8.0	8.0	中	100.0
3112.1	5752.6	4410.9	20.2	79.4	88.0	6.0	6.0	〃	127.0
3406.2	6204.4	4410.9	20.0	79.6	87.0	4.0	9.0	稍良	139.0
2940.6	5232.4	4410.9	20.6	79.4	93.0	2.0	5.0	〃	120.0
3185.7	5988.1	3920.8	21.0	79.4	91.0	3.0	6.0	中	130.0
2508.2	4741.3	3040.2	20.0	78.7	82.0	6.0	12.0	〃	102.4
2812.2	5094.5	3800.3	20.2	80.6	90.0	3.0	7.0	中下	114.8
2305.5	4245.8	3546.9	19.6	74.7	88.0	3.0	9.0	〃	94.1
2584.2	4681.5	4053.6	19.4	79.4	91.0	1.0	8.0	〃	105.5
2989.5	5475.3	4560.3	19.6	79.4	91.0	2.0	7.0	中	122.0
2800.1	5072.6	4235.4	20.4	79.4	91.0	1.0	8.0	〃	114.3
2305.9	4246.7	3058.9	19.8	79.4	93.0	1.0	6.0	〃	94.1
2823.6	5115.2	3529.5	19.8	78.7	88.0	3.0	9.0	中下	115.2
3058.9	5472.1	3764.8	20.2	78.1	87.0	2.0	11.0	〃	124.8
3129.5	5628.6	3294.2	20.6	78.7	88.0	4.0	8.0	〃	127.7

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第　拾　表　(C)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	8	18	3	1.30	4.7	6.22	7.22	11.1	97.0	19.1	1110.0	25.2	52.6
2	〃	〃	4	〃	〃	6.23	7.23	12.7	96.2	17.9	1270.0	24.8	54.3
3	〃	〃	5	〃	〃	6.22	7.22	12.8	98.0	17.9	1280.0	25.0	55.6
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.5	96.3	17.9	1350.0	24.6	54.1
5	〃	〃	7	〃	〃	6.21	7.21	14.7	97.5	19.5	1470.0	25.4	55.9
6	〃	20	5	〃	〃	6.23	7.23	15.0	98.3	19.1	1215.0	24.8	55.6
7	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	14.5	95.9	18.4	1174.5	25.0	55.2
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.4	96.7	18.2	1247.4	25.0	55.6
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	15.6	98.2	18.8	1263.6	25.2	54.1
10	〃	〃	9	〃	〃	6.21	7.21	16.4	95.0	18.6	1328.4	25.2	55.6
11	〃	22	6	〃	〃	6.23	7.23	16.2	97.9	19.7	1085.4	25.0	55.2
12	〃	〃	7	〃	〃	6.21	7.21	18.5	99.6	19.2	1239.5	25.0	55.6
13	〃	〃	8	〃	〃	6.22	7.22	17.6	99.4	20.1	1179.2	25.4	55.2
14	〃	〃	9	〃	〃	6.23	7.23	18.3	96.7	19.8	1226.1	24.2	55.6
15	〃	〃	10	〃	〃	6.21	7.21	19.3	97.2	18.9	1293.1	24.8	55.2
16	〃	24	7	〃	〃	6.23	7.23	20.4	95.5	19.0	1142.4	24.0	55.6
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	21.3	96.2	19.5	1192.8	24.0	55.2
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	22.0	96.6	18.8	1232.0	24.2	56.2
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	22.2	95.1	18.5	1243.2	24.0	54.6
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	22.3	98.8	19.3	1248.8	24.8	54.9

備考　粒重量指数ハ 8 合播株間 20cm 一株苗数 5 本

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

籾		一ヘクタール	玄			米			籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
2986.1	5676.9	3878.0	20.6	79.4	88.0	5.0	7.0	中下	82.0
3257.8	5999.6	2908.8	20.4	78.7	90.0	5.0	5.0	〃	89.5
3665.0	6591.8	2908.8	21.0	80.0	93.0	1.0	6.0	中上	100.7
3665.0	6774.5	3490.5	20.2	79.4	89.0	1.0	10.0	中	100.7
3878.0	6937.4	4653.6	20.8	79.4	92.0	1.0	7.0	中下	106.5
3641.2	6548.9	3743.3	20.2	80.0	91.0	4.0	5.0	中	100.0
2960.6	5363.4	3062.7	20.4	79.4	91.0	2.0	7.0	〃	81.3
3675.2	6610.1	3062.7	20.4	79.4	92.0	3.0	5.0	〃	100.9
3266.9	6038.6	4594.1	20.4	78.7	92.0	1.0	7.0	〃	89.7
3539.1	6365.3	4423.9	20.8	80.0	89.0	4.0	7.0	中上	97.2
3411.8	61808	3715.8	20.8	79.4	93.0	4.0	3.0	〃	93.7
3941.0	7088.1	3378.0	20.6	78.7	91.0	2.0	7.0	〃	108.2
3659.5	6629.5	3378.0	20.6	79.4	91.0	3.0	6.0	〃	100.5
3603.2	6480.6	3378.0	20.0	80.0	89.0	4.0	7.0	〃	99.0
3411.8	6180.8	3715.8	20.0	79.4	92.0	2.0	6.0	〃	93.7
2925.8	5262.2	3849.8	19.4	79.4	88.0	4.0	8.0	中下	80.4
3311.0	5998.2	3850.0	19.6	79.4	89.0	4.0	7.0	〃	90.9
3157.0	5719.2	3850.0	19.6	78.7	93.0	2.0	5.0	下	86.7
3133.9	5739.7	3388.0	19.4	79.4	94.0	2.0	4.0	〃	86.1
3769.2	6865.5	4235.0	20.2	78.1	90.0	2.0	8.0	中	103.5

植ヲ１００トセリ

第拾壹表 (d)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫當時 穗数	草丈	穗長	坪當穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	2.10	3.30	6.11	7.9	7.6	104.4	20.9	760.0	26.8	54.9
2	〃	〃	2	〃	〃	6.9	7.7	10.0	104.4	17.2	1000.0	26.8	54.1
3	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	10.3	103.4	18.2	1030.0	27.6	54.6
4	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.5	104.0	17.8	1250.0	27.6	54.6
5	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.9	98.4	18.0	1290.0	27.0	55.2
6	〃	20	2	〃	〃	6.10	7.8	10.7	105.8	19.5	866.7	2.62	54.1
7	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	12.9	104.6	18.4	1044.9	26.8	53.8
8	〃	〃	4	〃	〃	6.9	7.7	12.4	100.9	18.9	1004.4	27.6	55.6
9	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.9	102.2	18.0	1125.9	28.0	55.6
10	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	15.0	98.6	17.5	1215.0	28.0	57.1
11	〃	22	3	〃	〃	〃	〃	12.2	104.0	18.9	817.4	28.0	55.2
12	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	16.0	103.8	17.6	1072.0	27.4	55.2
13	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.4	102.0	18.8	1165.8	27.2	55.6
14	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	15.5	99.5	18.1	1038.5	27.8	55.6
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.4	103.1	17.7	1165.8	27.8	55.9
16	〃	24	5	〃	〃	〃	〃	19.3	103.1	18.8	1080.8	27.6	55.6
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	17.0	102.4	18.3	952.0	27.6	55.6
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	21.1	100.1	18.0	1181.6	28.2	56.5
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	17.7	100.4	18.7	991.2	27.8	56.5

備考 粒重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数3本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3982.8	7254.6	4033.2	22.6	80.6	97.0	1.0	2.0	良	89.2
5142.3	9505.2	5041.5	22.6	80.0	95.0	3.0	2.0	稍良	115.2
4638.2	8494.8	5041.5	23.2	80.2	95.0	3.0	2.0	中	103.9
4839.8	8864.2	5041.5	22.8	80.2	93.0	5.0	2.0	中上	108.4
5293.6	9589.8	5545.7	22.6	80.6	92.0	5.0	3.0	〃	118.6
4112.9	7602.5	4375.5	22.0	80.6	92.0	6.0	2.0	中	92.2
4463.0	8295.6	5250.6	22.4	80.6	90.0	4.0	6.0	〃	100.0
4638.0	8341.8	4375.5	23.0	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	103.9
4550.5	8184.4	5250.6	23.4	80.2	94.0	2.0	4.0	稍良	102.0
4638.0	8122.6	5250.6	23.4	80.6	96.0	1.0	3.0	良	103.9
4138.1	7496.5	4222.5	23.2	80.6	95.0	3.0	2.0	稍良	92.7
4222.5	7649.5	4222.5	23.0	80.6	95.0	1.0	4.0	〃	94.6
4475.9	8050.1	4222.5	23.0	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	100.3
4560.3	8202.0	4222.5	23.4	80.6	95.0	2.0	3.0	〃	102.2
4602.5	8233.5	5489.3	23.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	103.1
4620.0	8309.4	5005.0	23.0	80.6	95.0	3.0	2.0	〃	103.5
4312.0	7755.4	4620.0	22.8	81.3	97.0	2.0	1.0	中上	96.6
4158.0	7359.3	4620.0	24.0	81.3	97.0	1.0	2.0	稍良	93.2
4543.0	8040.7	5390.0	23.6	80.4	94.0	2.0	4.0	中上	101.8

植ヲ100トセリ

第拾貳表 (d)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトール当リ重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	6	18	2	2.10	3.30	6.10	7.8	8.3	102.8	19.0	830.0	27.2	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	10.3	98.8	18.1	1030.0	27.0	54.3
3	〃	〃	4	〃	〃	6.9	〃	11.3	98.2	17.9	1130.0	28.0	54.9
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.5	95.6	17.2	1250.0	27.6	54.6
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.6	96.5	17.6	1360.0	27.8	54.6
6	〃	20	3	〃	〃	6.11	7.9	11.5	100.6	18.7	931.5	26.4	54.6
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.7	100.6	17.6	1028.7	27.6	54.1
8	〃	〃	5	〃	〃	6.10	7.8	12.6	98.6	17.2	1020.6	27.2	54.6
9	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	14.5	97.9	17.3	1174.5	27.4	54.9
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.1	97.6	17.1	1304.1	27.0	55.6
11	〃	22	4	〃	〃	6.10	7.8	13.3	101.6	18.0	891.1	26.8	55.2
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.7	101.9	17.9	1185.9	26.8	54.1
13	〃	〃	6	〃	〃	6.9	7.7	16.9	99.9	17.9	1132.3	26.6	53.8
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.9	102.0	18.1	1132.3	26.8	54.1
15	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	20.7	103.0	17.9	1386.9	26.8	55.2
16	〃	24	5	〃	〃	6.10	7.8	18.6	105.1	18.4	1041.6	26.0	54.6
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.9	102.0	18.4	946.4	25.8	54.1
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.8	104.9	19.0	1164.8	26.0	55.6
19	〃	〃	8	〃	〃	6.9	7.9	22.2	101.6	18.6	1243.2	26.2	54.1
20	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	21.4	103.0	17.0	1198.4	26.6	55.2

備考 籾重量指数ハ 6 合播株間 20cm 一株苗数 3 本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

農業部農業試験所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4375.6	7869.8	4321.6	22.8	80.6	95.0	2.0	3.0	良	92.9
4537.5	8356.3	4321.4	23.0	80.0	92.0	3.0	5.0	稍良	96.3
4429.4	8068.2	5401.8	23.8	80.5	94.0	3.0	3.0	〃	94.0
4969.6	9101.9	5401.8	23.4	80.0	93.0	2.0	5.0	中上	105.5
5185.9	9498.0	5402.0	23.0	80.6	95.0	0	5.0	〃	110.1
4712.0	8630.0	4712.0	22.2	80.6	92.0	3.0	5.0	良	100.0
4994.7	9232.4	4712.0	23.4	80.6	94.0	3.0	3.0	稍良	106.0
4617.8	8457.4	5654.4	23.0	80.0	94.0	2.0	4.0	中上	98.0
4900.5	8926.2	5654.4	22.8	81.3	92.0	1.0	7.0	〃	104.0
5183.2	9322.3	5654.4	22.8	80.0	94.0	1.0	5.0	稍良	110.0
4644.8	8414.4	4644.8	22.4	81.3	92.0	4.0	4.0	〃	98.6
4644.8	8585.5	5067.0	22.4	80.6	94.0	2.0	4.0	〃	98.6
4813.7	8947.3	5067.0	22.4	80.5	93.0	2.0	5.0	〃	102.2
4644.8	8585.5	5067.0	22.4	80.0	9.2	3.0	5.0	〃	98.6
5404.8	9791.3	5489.3	22.2	80.6	92.0	3.0	5.0	〃	114.7
4581.5	8391.0	3850.0	21.8	81.3	94.0	1.0	5.0	〃	97.2
4389.0	8112.8	3850.0	21.8	80.0	91.0	2.0	7.0	〃	93.1
4851.0	8924.8	5390.0	21.4	80.0	91.0	1.0	8.0	〃	102.9
4466.0	8255.1	4620.0	22.0	80.0	94.0	1.0	5.0	〃	94.8
4543.0	8230.1	5390.0	22.2	81.3	93.0	3.0	4.0	中上	96.4

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾参表 (d)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	8	18	3	2.10	3.30	6.13	7.11	10.5	100.7	19.0	1050.0	25.2	53.8
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.5	98.4	18.8	1150.0	26.0	55.6
3	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	12.7	97.0	17.6	1270.0	25.4	53.5
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.3	98.1	16.9	1430.0	25.6	53.5
5	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.4	97.4	16.8	1640.0	26.0	55.6
6	〃	20	5	〃	〃	6.14	7.12	15.5	99.3	18.0	1255.5	25.2	55.2
7	〃	〃	6	〃	〃	6.13	7.11	16.1	101.2	18.0	1304.1	25.2	53.8
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.2	101.1	17.8	1393.2	26.0	54.3
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	17.1	96.6	16.6	1385.1	25.4	53.8
10	〃	〃	9	〃	〃	6.11	7.9	18.0	98.4	18.2	1458.0	25.8	54.6
11	〃	22	6	〃	〃	6.13	7.11	16.6	100.5	18.9	1112.2	25.8	54.3
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	18.4	100.0	18.4	1232.8	25.0	54.3
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.0	97.6	17.7	1273.0	25.0	54.6
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	19.6	98.4	18.6	1313.2	25.2	54.1
15	〃	〃	10	〃	〃	6.12	7.10	20.4	100.5	18.0	1366.8	25.4	54.1
16	〃	24	7	〃	〃	6.13	7.11	18.9	101.4	18.9	1058.4	25.0	54.9
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	21.1	89.3	19.0	1181.6	25.8	54.9
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	21.4	91.8	18.0	1198.4	25.4	53.2
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	20.9	89.7	18.0	1170.4	25.6	53.8
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	22.8	90.8	18.5	1276.8	26.0	54.6

備考 籾重量指数ハ 8合播株間 20cm 一株苗数 5本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4595.8	8542.4	4072.3	21.2	80.6	87.0	7.0	6.0	中上	87.4
4421.1	7951.6	5818.3	21.6	80.1	97.0	1.0	2.0	〃	84.1
4421.1	8263.8	3490.4	21.2	80.2	90.0	2.0	8.0	〃	84.1
4886.5	9133.6	4653.8	21.4	80.0	95.0	2.0	3.0	稍良	92.9
5410.3	9730.7	5817.5	22.0	81.3	90.0	5.0	5.0	良	102.9
5257.6	9524.7	4594.1	21.0	80.6	89.0	6.0	5.0	中上	100.0
4390.1	8160.0	5104.8	21.2	80.0	90.0	2.0	8.0	稍良	83.5
4594.3	8460.9	5104.7	21.2	80.6	92.0	2.0	6.0	〃	87.4
4390.1	8160.0	5104.8	21.2	80.0	88.0	4.0	8.0	〃	83.5
4594.1	8414.0	4594.1	21.6	81.3	94.0	3.0	3.0	良	87.4
4882.9	8992.4	4145.9	21.6	81.3	92.0	4.0	4.0	稍良	92.9
4514.1	8313.3	3685.0	21.0	80.6	94.0	3.0	3.0	〃	85.9
4329.9	7930.2	4606.3	21.4	80.1	96.0	1.0	3.0	中上	82.4
4514.1	8344.0	4606.3	20.8	81.3	94.0	3.0	3.0	〃	85.9
4928.9	9110.8	5067.2	21.2	80.5	92.0	4.0	4.0	〃	93.7
3980.9	7251.2	4658.5	21.0	80.6	93.0	4.0	3.0	〃	75.7
4489.1	8176.9	4235.0	21.4	81.3	92.0	2.0	6.0	〃	85.4
4319.7	8119.7	5082.0	21.0	80.6	87.0	6.0	7.0	〃	82.2
4235.0	7871.7	4235.0	21.4	80.0	91.0	2.0	7.0	〃	80.5
4150.3	7601.3	4658.5	21.6	81.3	93.0	4.0	3.0	〃	78.9

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾四表 (2)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	収穫当時 草丈	収穫当時 穗長	収穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	2	18	1	2.10	4.9	6.19	7.19	8.1	100.8	20.3	810.0	24.6	55.2
2	〃	〃	2	〃	〃	6.17	7.17	10.9	106.8	20.9	1090.0	25.8	55.9
3	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	11.1	102.0	19.6	1110.0	24.8	55.5
4	〃	〃	4	〃	〃	6.16	7.16	14.2	104.9	20.6	1420.0	25.4	55.2
5	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.7	102.3	20.1	1370.0	25.4	55.9
6	〃	20	2	〃	〃	6.18	7.18	11.3	103.8	19.9	915.3	25.0	55.2
7	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	14.5	105.6	20.3	1174.5	25.4	55.9
8	〃	〃	4	〃	〃	6.16	7.16	14.4	105.8	20.0	1166.4	24.8	55.9
9	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	16.0	105.9	19.9	1296.0	24.8	55.2
10	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.6	105.2	19.9	1344.6	25.4	57.8
11	〃	22	3	〃	〃	6.18	7.18	14.4	107.2	20.3	964.8	25.8	56.2
12	〃	〃	4	〃	〃	6.16	7.16	15.4	105.1	20.1	1031.8	25.6	54.6
13	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	18.2	107.9	20.6	1219.4	25.0	56.8
14	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.1	105.9	19.9	1279.7	25.2	55.9
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.3	107.6	19.5	1293.1	25.2	55.9
16	〃	24	5	〃	〃	〃	〃	18.2	107.4	20.5	1019.2	25.0	54.1
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	20.0	107.7	20.6	1120.0	25.2	56.5
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	21.7	105.3	19.7	1215.2	25.0	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	20.9	104.2	19.8	1170.4	25.0	55.9

備考　籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数三本

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
3932.5	7124.1	3025.0	20.0	79.4	90.0	2.0	8.0	中上	90.5
4456.0	7971.4	3781.2	21.2	79.5	92.0	2.0	6.0	〃	102.6
4159.3	7494.3	2520.8	20.4	79.5	96.0	1.0	3.0	〃	95.8
4459.0	8077.9	3781.2	21.0	79.5	94.0	0	6.0	稍良	102.7
4460.0	7978.5	5041.6	20.8	80.0	93.0	2.0	5.0	〃	102.7
4065.4	7364.8	2784.5	20.6	80.6	92.0	1.0	7.0	〃	93.6
4343.6	7770.3	3341.3	21.0	79.5	93.0	0	7.0	〃	100.0
4455.0	7969.6	3341.3	20.2	79.4	96.0	0	4.0	〃	102.6
4455.0	8070.7	3341.3	20.4	79.4	94.0	1.0	5.0	良	102.6
4789.3	8286.1	5012.1	20.8	79.4	93.0	1.0	6.0	稍良	110.3
5179.6	9216.4	5067.0	21.2	80.6	92.0	1.0	7.0	良	119.2
4357.6	7980.9	3040.2	21.0	80.0	93.0	0	7.0	稍良	100.3
4864.3	8563.9	4053.6	20.8	80.6	97.0	0	3.0	中上	112.1
4256.3	7614.1	4053.6	20.8	80.0	90.0	2.0	8.0	〃	98.0
4466.0	7989.3	5067.0	20.8	80.6	95.0	0	5.0	稍良	102.8
4423.2	8175.9	4705.5	20.6	80.0	93.0	1.0	6.0	中上	101.8
4423.2	7828.6	2823.3	21.0	80.0	92.0	1.0	7.0	稍良	101.8
4140.8	7368.0	3764.4	20.8	80.0	94.0	0	6.0	〃	95.3
4534.1	8111.0	4982.5	20.8	80.6	92.0	0	8.0	〃	104.4

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾五表 (ℓ)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	2.10	4.9	6.18	7.18	10.4	103.5	19.1	1040.0	25.6	56.5
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	10.8	105.3	20.3	1080.0	25.4	54.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	13.3	102.8	19.3	1330.0	25.6	54.9
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.7	103.7	18.6	1370.0	25.0	54.1
5	〃	20	2	〃	〃	6.19	7.19	10.8	105.0	19.5	874.8	25.4	55.6
6	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	13.0	104.5	18.3	1053.0	25.4	55.9
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	13.8	101.3	20.0	1117.8	25.0	55.2
8	〃	〃	5	〃	〃	6.18	7.18	15.5	104.1	20.1	1255.5	25.0	55.2
9	〃	〃	6	〃	〃	6.17	7.17	16.3	104.3	19.1	1320.3	25.0	55.9
10	〃	22	3	〃	〃	6.18	7.18	14.3	102.1	20.4	958.1	24.8	56.5
11	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	15.1	104.2	20.4	1011.7	25.6	56.5
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	16.6	103.4	19.9	1112.2	25.2	56.8
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	17.7	104.2	19.6	1185.9	25.0	56.2
14	〃	〃	7	〃	〃	6.17	〃	19.2	105.7	18.8	1286.4	25.0	55.2
15	〃	24	4	〃	〃	6.19	7.19	17.1	99.7	20.2	957.6	24.8	54.9
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	18.7	103.6	19.8	1047.2	24.4	56.5
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.7	105.1	19.7	1103.2	24.8	55.6
18	〃	〃	7	〃	〃	6.17	7.17	19.6	104.4	19.5	1097.6	25.0	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	21.6	102.2	19.4	1209.6	24.6	56.2

備考 粒重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数三本

籾		一ヘクタール	玄					米	籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4167.6	7376.4	3697.1	21.0	80.6	94.0	1.0	5.0	中上	109.5
3882.0	7071.0	3529.1	21.0	81.3	91.0	2.0	7.0	〃	102.0
4386.1	7989.3	4537.4	21.0	80.6	90.0	3.0	7.0	〃	115.2
4100.4	7579.3	4369.3	20.8	81.3	90.0	2.0	8.0	中	107.7
3471.2	6243.2	3792.1	21.0	81.3	91.0	2.0	7.0	〃	91.2
3806.7	6809.8	3938.0	20.8	80.6	92.0	2.0	6.0	中上	100.0
3719.2	6737.6	3938.0	20.4	80.0	96.0	1.0	3.0	〃	97.7
3981.7	7213.2	4813.1	20.4	80.0	93.0	1.0	6.0	〃	104.6
4171.3	7462.1	4083.8	20.6	80.6	94.0	2.0	4.0	〃	109.6
3349.9	5928.9	3659.5	20.6	80.6	92.0	3.0	5.0	〃	88.0
3631.4	6427.2	4222.5	21.4	80.6	89.0	5.0	6.0	中	95.4
3758.0	6616.2	4222.5	20.6	80.6	92.0	3.0	5.0	〃	98.7
3631.4	6461.5	4222.5	20.4	80.0	95.0	1.0	4.0	〃	95.4
3969.2	7190.5	4504.0	20.6	80.6	93.0	1.0	6.0	中上	104.3
3131.1	5703.3	3593.1	20.2	79.4	95.0	1.0	4.0	中	82.3
3657.5	6473.5	4620.0	20.0	80.0	96.0	1.0	3.0	〃	96.1
3336.5	6000.8	5133.0	20.4	80.6	93.0	1.0	6.0	中下	87.6
3644.4	6484.8	4619.7	20.4	80.6	95.0	0	5.0	中上	95.7
3811.5	6782.0	5197.5	20.2	80.0	95.0	1.0	4.0	稍良	100.1

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾六表 (ℓ)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	6	18	2	2.10	4.9	6.23	7.23	9.6	98.5	20.9	960.0	24.6	55.9
2	〃	〃	3	〃	〃	6.24	7.24	10.1	102.7	20.8	1010.0	25.2	54.2
3	〃	〃	4	〃	〃	6.23	7.23	14.3	99.7	19.7	1430.0	24.6	56.0
4	〃	〃	5	〃	〃	6.22	7.22	12.9	97.6	19.6	1290.0	24.6	56.0
5	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	15.0	97.5	19.4	1500.0	24.4	56.5
6	〃	20	3	〃	〃	6.23	7.23	13.1	98.9	19.7	1061.1	24.6	56.2
7	〃	〃	4	〃	〃	6.22	7.22	13.9	97.6	19.7	1125.9	24.8	55.5
8	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	15.7	101.3	19.6	1271.7	25.6	56.0
9	〃	〃	6	〃	〃	6.19	7.19	18.0	101.0	20.0	1458.0	24.8	54.0
10	〃	〃	7	〃	〃	6.19	7.19	17.7	100.4	20.0	1433.7	24.8	55.9
11	〃	22	4	〃	〃	6.22	7.22	16.6	98.9	19.6	1112.2	25.0	55.9
12	〃	〃	5	〃	〃	6.22	7.22	17.8	101.6	19.1	1192.6	24.8	55.0
13	〃	〃	6	〃	〃	6.21	7.21	18.3	103.3	20.4	1226.1	24.6	53.0
14	〃	〃	7	〃	〃	6.21	7.21	18.8	101.1	20.4	1259.6	24.4	55.9
15	〃	〃	8	〃	〃	6.22	7.22	18.9	101.5	19.6	1266.3	24.6	52.9
16	〃	24	5	〃	〃	6.22	7.22	20.1	99.7	18.8	1125.6	24.6	54.9
17	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	19.9	104.3	20.0	1114.4	24.6	55.0
18	〃	〃	7	〃	〃	6.22	7.22	19.5	99.2	20.5	1092.0	24.0	53.0
19	〃	〃	8	〃	〃	6.21	7.21	26.4	102.2	20.5	1478.4	24.8	55.9
20	〃	〃	9	〃	〃	6.22	7.22	22.9	101.7	20.3	1282.4	24.4	54.3

備考 粒重量指数ハ 6合播株間 20cm 一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3368.8	6026.4	2750.0	20.0	79.0	96.0	1.0	3.0	稍良	86.8
3987.5	7357.0	2750.0	21.8	79.0	96.0	1.0	3.0	〃	102.8
4675.0	8348.2	4125.0	20.4	80.0	98.0	0	2.0	〃	120.5
4262.5	7611.6	4125.0	19.8	79.0	97.0	0	3.0	中下	109.9
4468.8	7909.3	3437.5	20.0	80.6	93.0	2.0	5.0	中	115.2
3879.7	6903.4	4764.6	20.2	80.0	94.0	0	6.0	中上	100.0
3811.5	6867.6	2722.5	20.2	79.0	95.0	2.0	3.0	中	98.2
4492.1	8021.7	4083.8	20.8	79.0	93.0	1.0	6.0	〃	115.8
4628.3	8570.8	4083.8	20.4	79.0	94.0	1.0	5.0	稍良	119.3
4628.4	8279.8	4764.6	20.4	80.0	97.0	0	3.0	〃	119.3
3659.5	6546.5	4504.0	20.4	79.4	97.0	0	3.0	〃	94.3
4053.4	7369.9	4503.8	20.0	79.4	95.0	1.0	4.0	〃	104.5
4053.4	7648.0	4503.8	20.0	78.2	94.0	1.0	5.0	〃	104.5
4278.6	7654.0	4503.8	20.0	79.0	90.0	1.0	9.0	中	110.3
4109.9	7769.2	4504.0	20.0	79.4	93.0	0	7.0	稍良	105.9
3441.1	6267.9	5294.0	20.2	80.0	97.0	1.0	2.0	中上	88.7
3388.0	6160.0	4235.0	20.4	79.0	93.0	1.0	6.0	中	87.3
3176.3	5992.9	3176.3	19.6	79.0	91.0	2.0	7.0	〃	81.9
4446.8	7954.8	4235.0	20.0	79.0	90.0	1.0	9.0	〃	114.6
3970.5	7312.2	5294.0	19.8	79.4	90.0	2.0	8.0	中上	102.3

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第拾七表 (ℓ)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時					
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	2.10	4.9	6.25	7.25	11.7	95.1	20.3	1170.0	24.0	53.5
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.2	95.7	19.6	1120.0	24.2	52.5
3	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.5	96.5	19.9	1350.0	24.6	53.0
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.9	97.1	19.3	1390.0	24.0	52.0
5	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	13.5	95.4	19.0	1350.0	24.0	54.1
6	〃	20	5	〃	〃	〃	〃	14.6	95.1	18.5	1182.6	24.0	52.9
7	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.3	97.5	19.0	1320.3	24.2	52.0
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.0	96.8	18.4	1377.0	24.0	52.0
9	〃	〃	8	〃	〃	6.24	7.24	15.3	95.2	19.4	1239.3	25.0	54.0
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	17.8	97.5	19.2	1441.8	24.4	53.5
11	〃	22	6	〃	〃	6.25	7.25	16.1	97.5	19.0	1078.7	23.0	53.5
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.4	97.0	19.5	1098.8	24.4	51.0
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	23.4	99.6	19.0	1567.8	23.6	52.0
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	21.8	97.8	19.3	1460.6	23.4	51.0
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	20.8	100.0	18.9	1393.6	23.6	5.29
16	〃	24	7	〃	〃	〃	〃	20.9	101.7	19.7	1170.4	24.8	54.6
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	23.7	102.6	18.4	1327.2	24.6	55.2
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	23.8	100.3	20.1	1332.8	25.0	53.8
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	24.0	99.3	18.3	1344.0	25.0	54.9
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	23.3	98.3	18.7	1304.8	25.6	56.2

備考 籾重量指数ハ8合播株間20cm一株苗数五本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3025.0	5654.1	3781.2	19.4	78.2	91.0	1.0	8.0	中	104.5
2898.9	5521.8	3781.2	19.4	78.2	90.0	1.0	9.0	〃	100.1
3655.2	6896.5	5041.6	19.8	78.2	87.0	5.0	8.0	中上	126.2
3781.2	7271.5	5041.6	19.6	78.0	84.0	2.0	14.0	〃	130.6
3592.1	6639.8	5041.6	19.6	79.0	94.0	1.0	5.0	中	124.0
2895.6	5474.3	5569.0	19.4	78.0	88.0	1.0	11.0	〃	100.0
3452.6	6639.7	4455.0	19.4	78.0	87.0	1.0	12.0	〃	119.2
3564.0	6853.8	4455.0	20.0	78.5	88.0	2.0	10.0	〃	123.1
3675.4	6806.3	4455.0	20.4	78.2	88.0	1.0	11.0	〃	126.9
3731.2	6974.3	5012.1	20.0	78.7	91.0	3.0	6.0	〃	128.8
2702.4	5051.2	4504.0	18.6	78.2	87.0	4.0	9.0	〃	93.3
2330.8	4570.2	4053.6	19.6	78.0	85.0	2.0	13.0	〃	80.5
2938.9	5651.7	5067.0	19.0	78.0	93.0	1.0	6.0	中下	101.5
2837.5	5563.8	4053.6	19.0	78.2	84.0	4.0	12.0	〃	98.0
2758.7	5214.9	4504.0	19.2	78.2	83.0	3.0	14.0	中	95.3
3623.2	6636.0	5176.1	20.2	80.0	94.0	2.0	4.0	稍良	125.1
3670.3	6649.1	4705.5	20.2	78.7	91.0	2.0	7.0	〃	126.7
3764.4	6997.0	3764.4	20.6	78.7	87.0	4.0	9.0	〃	130.0
3576.2	6514.0	4705.5	20.4	78.7	89.0	3.0	8.0	〃	123.5
4235.0	7535.5	3764.4	21.2	80.0	95.0	1.0	4.0	中上	146.2

植ヲ１００トセリ

第拾八表 (f)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	収穫当時 草丈	収穫当時 穗長	収穫当時 坪当穗数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	2.20	3.31	6.11	7.9	7.9	91.7	17.9	790.0	25.8	53.8
2	〃	〃	2	〃	〃	6.10	7.8	10.1	98.0	20.2	1010.0	25.8	54.3
3	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	10.8	95.7	19.4	1080.0	25.8	54.3
4	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.7	101.4	18.5	1270.0	25.4	54.3
5	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	14.8	103.0	18.2	1480.0	26.4	53.8
6	〃	20	2	〃	〃	6.11	7.9	11.1	105.2	19.4	899.1	26.6	54.9
7	〃	〃	3	〃	〃	6.9	7.7	13.3	104.2	18.8	1077.3	26.6	54.1
8	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	14.5	104.7	18.9	1174.5	26.0	54.6
9	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.9	104.6	18.5	1287.9	26.4	54.1
10	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	17.3	105.6	18.7	1401.3	26.4	54.3
11	〃	22	3	〃	〃	6.10	7.8	14.3	105.3	20.0	958.1	25.8	53.8
12	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	15.6	104.6	17.9	1045.2	25.8	54.6
13	〃	〃	5	〃	〃	6.9	7.7	18.0	105.1	18.0	1206.0	25.4	53.8
14	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.5	105.1	19.0	1306.5	25.8	54.6
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.3	104.4	18.3	1360.1	25.8	54.9
16	〃	24	5	〃	〃	6.10	7.8	18.5	105.8	18.5	1036.0	25.8	55.9
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	21.0	106.3	18.7	1176.0	26.0	54.6
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	22.2	104.7	20.0	1243.2	26.4	55.6
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	22.7	104.0	18.2	1271.2	25.8	55.9

備考 籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数三本

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4490.2	8346.1	4253.9	21.6	81.3	95.0	2.0	3.0	良	98.7
4821.0	8878.5	4726.5	21.6	80.6	91.0	4.0	5.0	稍良	105.9
4537.4	8356.2	4726.5	21.8	81.3	92.0	2.0	6.0	〃	99.7
5293.7	9749.0	4726.5	21.2	81.3	90.0	5.0	5.0	良	116.3
4773.8	8873.2	3781.2	22.2	80.6	91.0	4.0	5.0	稍良	104.9
4944.3	9006.0	5688.2	22.4	82.0	92.0	3.0	5.0	〃	108.7
4550.5	8411.3	5250.6	22.2	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	100.0
4725.5	8654.8	4375.5	21.6	81.3	88.0	4.0	8.0	中上	103.8
4725.5	8734.8	5250.6	22.2	81.3	92.0	3.0	5.0	稍良	103.8
4856.8	8944.4	4375.5	21.6	82.0	94.0	2.0	4.0	〃	106.7
4138.1	7691.5	5067.0	21.4	81.3	87.0	6.0	7.0	中上	90.9
4391.4	8042.9	4222.5	21.6	81.3	90.0	2.0	8.0	稍良	96.5
4644.8	8633.4	5067.0	21.2	81.0	94.0	2.0	4.0	良	102.1
4644.8	8506.9	5067.0	21.2	81.4	90.0	4.0	6.0	〃	102.1
4898.1	8921.9	5489.3	21.6	81.3	93.0	2.0	5.0	稍良	107.6
4620.0	8264.8	4235.0	21.4	81.2	95.0	1.0	4.0	〃	101.5
5313.0	9730.8	5390.0	22.0	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	116.8
4389.0	7893.9	4620.0	21.8	81.3	88.0	6.0	6.0	〃	96.5
4658.5	8333.6	4620.0	21.6	82.0	92.0	3.0	5.0	中上	102.4

植ヲ100トセリ

第拾九表 (f)

番號	播種量	株間	苗数	播種量	插秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	2.20	3.31	6.13	7.11	9.3	101.5	19.4	930.0	25.8	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	6.10	7.9	11.5	103.0	19.0	1150.0	26.4	54.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.6	100.5	18.4	1260.0	26.2	55.2
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.4	101.0	18.0	1540.0	26.4	55.6
5	〃	20	2	〃	〃	6.15	7.13	10.3	102.2	19.5	834.3	26.6	55.9
6	〃	〃	3	〃	〃	6.14	7.12	12.6	103.2	19.2	1020.6	25.8	54.6
7	〃	〃	4	〃	〃	6.13	7.11	13.3	92.7	18.4	1077.3	25.6	56.5
8	〃	〃	5	〃	〃	6.11	7.9	15.5	93.0	18.4	1255.5	25.4	55.6
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	18.4	91.9	19.1	1490.4	25.6	55.6
10	〃	22	3	〃	〃	6.14	7.12	13.8	104.5	20.2	924.6	25.8	56.8
11	〃	〃	4	〃	〃	6.13	7.11	16.0	103.0	19.8	1072.0	27.2	56.8
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	18.1	102.2	18.3	1212.7	25.4	56.5
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	18.9	99.1	18.8	1266.3	25.0	56.2
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.6	102.2	19.1	1313.2	25.4	56.8
15	〃	24	4	〃	〃	6.14	7.12	16.8	103.3	19.9	940.8	25.2	56.5
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	18.9	101.4	18.9	1058.4	25.0	55.6
17	〃	〃	6	〃	〃	6.15	7.13	20.4	102.9	19.3	1142.4	25.8	57.1
18	〃	〃	7	〃	〃	6.13	7.11	22.2	101.3	18.9	1243.2	25.0	54.1
19	〃	〃	8	〃	〃	6.12	7.10	20.7	103.3	17.9	1159.2	25.0	55.9

備考 籾重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾			玄	米					籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
g	ℓ	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4159.3	7480.8	4726.5	21.4	81.3	96.0	2.0	2.0	稍良	92.6
4726.5	8609.3	5671.8	21.6	81.0	92.0	2.0	6.0	中上	105.2
4442.9	8048.8	4726.5	22.0	82.0	92.0	2.0	6.0	稍良	98.9
5151.9	9265.9	5671.8	21.6	82.0	93.0	4.0	3.0	〃	114.7
3920.6	7013.7	4084.0	22.0	82.0	93.0	4.0	3.0	〃	87.3
4492.1	8227.3	4083.8	21.2	81.2	93.0	1.0	6.0	〃	100.0
4328.8	7661.5	4083.8	21.4	81.3	95.0	2.0	3.0	〃	96.4
4328.8	7785.6	4900.5	21.2	82.0	95.0	1.0	4.0	中上	96.4
4778.3	8594.0	5717.6	21.0	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	106.4
4482.1	7891.1	4677.0	21.4	82.0	96.0	2.0	2.0	〃	99.8
5066.8	8920.3	5456.5	22.4	82.0	92.0	3.0	5.0	〃	112.8
4677.0	8277.9	4677.0	21.0	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	104.1
4131.4	7351.2	4677.0	20.8	81.0	93.0	2.0	5.0	〃	92.0
4443.2	7822.4	5066.8	21.2	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	98.9
4023.1	7120.4	4234.8	21.0	81.3	95.0	2.0	3.0	〃	89.6
4376.3	7871.0	4235.1	21.0	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	97.4
4235.1	7417.0	4941.0	21.4	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	94.3
4164.5	7697.8	4941.0	21.0	81.3	92.0	2.0	6.0	〃	92.7
3952.5	7070.6	4941.0	21.0	82.0	94.0	2.0	4.0	〃	88.0

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第貳拾表 (f)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	6	18	2	2.20	3.31	6.14	7.14	10.1	101.7	19.1	1010.0	25.0	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	6.13	7.13	12.6	101.6	19.1	1260.0	25.0	54.4
3	〃	〃	4	〃	〃	6.10	7.10	13.3	99.7	18.4	1330.0	25.4	54.1
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.7	99.6	18.3	1370.0	25.4	54.3
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.6	100.6	18.1	1460.0	26.0	54.9
6	〃	20	3	〃	〃	6.13	7.13	13.0	103.0	18.4	1053.0	25.0	55.9
7	〃	〃	4	〃	〃	6.11	7.11	13.4	98.5	18.7	1085.4	25.8	55.6
8	〃	〃	5	〃	〃	6.13	7.13	15.1	99.7	17.8	1223.1	25.8	56.5
9	〃	〃	6	〃	〃	6.14	7.14	17.0	99.5	18.8	1377.0	25.8	56.2
10	〃	〃	7	〃	〃	6.13	7.13	15.9	99.8	17.5	1287.9	25.8	56.5
11	〃	22	4	〃	〃	6.13	〃	14.6	100.8	18.7	978.2	25.6	54.6
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.7	102.6	18.3	1185.9	25.6	56.5
13	〃	〃	6	〃	〃	6.11	7.11	18.9	98.8	18.9	1266.3	25.2	55.6
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.0	103.4	18.6	1340.0	25.8	55.6
15	〃	〃	8	〃	〃	6.10	7.10	23.2	102.4	18.2	1554.4	25.2	55.6
16	〃	24	5	〃	〃	6.15	7.15	19.2	102.3	19.3	1075.2	25.2	55.6
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	21.2	101.6	20.1	1187.2	24.8	55.6
18	〃	〃	7	〃	〃	6.13	7.13	21.2	90.3	18.7	1187.2	24.6	54.9
19	〃	〃	8	〃	〃	6.12	7.12	21.9	101.8	18.4	1226.4	25.0	55.6
20	〃	〃	9	〃	〃	6.13	7.13	24.5	101.6	18.6	1372.0	24.8	55.9

備考 籾重量指数ハ 6合播株間 20cm 一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4270.6	7680.9	3114.0	21.0	81.3	94.0	2.0	4.0	中上	105.2
4537.5	8340.9	4448.5	21.0	81.3	95.0	0	5.0	〃	111.8
4181.6	7729.4	3558.8	20.8	81.2	96.0	0	4.0	〃	103.0
3914.7	7209.4	4448.5	21.2	80.8	95.0	0	5.0	中	96.5
4671.0	8508.1	4448.5	21.8	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	115.1
4058.2	7259.8	3445.7	21.0	80.6	93.0	1.0	6.0	中上	100.0
4287.9	7712.1	3828.5	21.6	82.0	95.0	0	5.0	〃	105.7
4287.9	7589.2	3828.5	21.4	82.0	96.0	0	4.0	〃	105.7
4594.2	8174.7	3828.5	21.4	82.0	95.0	1.0	4.0	稍良	113.2
4441.1	7860.3	4211.4	21.6	82.0	97.0	1.0	2.0	中上	109.4
4234.2	7755.0	3619.0	21.4	82.6	97.0	0	3.0	稍良	104.3
4487.9	7943.1	3619.3	21.4	82.0	97.0	0	3.0	〃	110.6
4198.3	7551.0	3619.3	21.0	82.0	96.0	0	4.0	〃	103.5
3981.2	7160.4	5067.0	21.2	82.0	97.0	0	3.0	〃	98.1
5278.1	9493.0	3800.3	21.0	82.0	97.0	0	3.0	中上	130.0
3974.2	7147.8	4234.8	20.8	82.0	94.0	2.0	4.0	〃	97.9
4039.6	7265.5	3909.3	20.6	81.3	94.0	0	6.0	〃	99.5
4039.6	7358.1	4560.9	20.6	82.0	91.0	2.0	7.0	稍良	99.5
3909.3	7031.1	3909.3	21.0	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	96.3
4462.8	7983.5	5212.0	20.6	80.6	93.0	2.0	5.0	〃	110.0

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第貳拾壹表（f）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時					
								穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	2.20	3.31	6.14	7.14	11.4	102.3	20.1	1140.0	25.0	55.6
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.7	98.3	19.0	1270.0	24.6	53.8
3	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.5	98.1	18.2	1350.0	24.6	53.8
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.8	97.3	18.2	1480.0	24.8	54.3
5	〃	〃	7	〃	〃	6.13	7.13	14.9	96.0	18.0	1490.0	25.0	54.3
6	〃	20	5	〃	〃	〃	〃	14.7	99.5	18.9	1190.7	25.0	55.2
7	〃	〃	6	〃	〃	6.14	7.14	16.0	98.6	19.3	1296.0	25.6	54.6
8	〃	〃	7	〃	〃	6.13	7.14	15.3	96.3	17.8	1239.3	25.4	55.2
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	7.13	16.1	96.8	17.0	1304.1	25.8	55.9
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	7.14	16.8	94.1	17.8	1360.8	25.0	55.6
11	〃	22	6	〃	〃	6.14	〃	16.8	97.8	19.3	1125.6	25.6	56.5
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.8	95.3	17.1	1125.6	25.8	56.8
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.6	97.4	16.9	1313.2	25.0	56.8
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	18.2	97.6	16.9	1219.4	25.6	54.9
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	19.4	97.7	17.1	1299.8	25.2	56.5
16	〃	24	7	〃	〃	〃	〃	17.9	98.9	18.2	1002.4	25.8	56.5
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.1	97.0	17.4	1069.6	26.0	55.6
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	19.4	98.6	17.2	1086.4	25.6	55.9
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	23.3	95.2	16.8	1304.8	25.2	55.9
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	22.8	99.4	19.5	1276.8	25.6	56.5

備考 数重量指数ハ 8 合播株間 20cm 一株苗数五本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4188.6	7533.5	4072.3	20.8	81.3	91.0	2.0	7.0	中上	95.4
4188.4	7785.2	3490.4	20.4	81.2	90.0	1.0	9.0	〃	95.4
4537.5	8433.9	4653.8	20.6	81.2	95.0	0	5.0	稍良	103.4
4770.1	8784.8	5817.3	20.4	81.5	92.0	1.0	7.0	〃	108.7
4770.4	8785.2	5235.8	20.8	82.0	96.0	0	4.0	〃	108.7
4389.9	7952.7	4594.1	21.0	82.0	95.0	1.0	4.0	〃	100.0
4594.3	8414.4	4083.8	21.4	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	104.7
4185.9	7543.1	4083.8	21.2	81.7	98.0	0	2.0	〃	95.4
4696.4	8401.4	4083.8	21.4	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	107.0
4645.1	8354.5	3573.2	21.0	82.0	98.0	0	2.0	〃	105.8
4514.4	7990.0	4145.9	21.4	82.0	94.0	1.0	5.0	〃	102.8
3961.4	6974.3	3685.0	21.6	81.7	97.0	0	3.0	〃	90.2
4422.0	7785.2	3685.0	21.0	81.7	94.0	1.0	5.0	〃	100.7
4422.0	8054.6	4606.3	21.2	81.2	97.0	0	3.0	〃	100.7
4560.4	8071.6	4145.9	21.0	82.0	95.0	0	5.0	〃	103.9
4140.8	7328.9	4235.0	21.6	81.3	95.0	0	5.0	〃	94.3
4329.1	7786.1	3764.4	21.6	81.0	94.0	0	6.0	〃	98.6
4329.1	7744.3	3764.4	21.4	81.5	94.0	1.0	5.0	〃	98.6
4329.1	7744.3	3764.4	21.2	81.3	97.0	0	3.0	〃	98.6
4329.1	7662.1	3293.9	21.2	82.0	96.0	1.0	3.0	〃	98.6

植ヲ100トセリ

第貳拾貳表（g）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時					
								穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	2	18	1	2.20	4.10	6.20	7.20	8.1	100.9	20.3	810.0	25.4	57.1
2	〃	〃	2	〃	〃	6.19	7.19	9.2	101.8	21.5	920.0	26.0	57.1
3	〃	〃	3	〃	〃	6.18	7.18	11.1	101.1	20.4	1110.0	26.0	57.5
4	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.9	98.0	21.5	1190.0	25.8	57.1
5	〃	〃	5	〃	〃	6.16	7.16	13.8	103.0	20.9	1380.0	26.0	57.5
6	〃	20	2	〃	〃	6.19	7.19	10.1	103.6	21.3	818.1	24.8	56.8
7	〃	〃	3	〃	〃	6.18	7.18	12.2	102.1	21.4	988.2	25.4	57.1
8	〃	〃	4	〃	〃	6.19	7.19	13.0	102.2	21.7	1053.0	25.4	56.8
9	〃	〃	5	〃	〃	6.16	7.16	15.1	102.9	19.8	1223.1	24.2	53.8
10	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.5	103.5	19.7	1336.5	24.4	54.6
11	〃	22	3	〃	〃	6.20	7.20	13.4	103.7	20.6	897.8	24.8	53.5
12	〃	〃	4	〃	〃	6.20	〃	16.0	104.7	21.0	1072.0	24.6	54.9
13	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	17.4	105.6	20.9	1165.8	24.8	56.2
14	〃	〃	6	〃	〃	6.18	7.18	18.7	103.3	20.5	1252.9	24.8	53.5
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.7	104.0	21.2	1319.9	24.4	54.1
16	〃	24	5	〃	〃	〃	〃	18.6	105.1	20.9	1041.6	25.0	54.3
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.3	104.6	21.7	1080.8	25.0	54.3
18	〃	〃	7	〃	〃	6.16	〃	21.2	104.2	21.3	1187.2	24.8	54.6
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	22.3	103.3	20.6	1248.8	24.6	54.3

備考　籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数三本植

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄			米			籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4886.7	8558.1	5235.8	21.0	80.0	95.0	0	5.0	中上	112.6
5235.8	9169.4	5817.5	21.4	80.6	95.0	0	5.0	〃	120.7
5119.4	8903.3	5817.5	22.0	80.6	97.0	0	3.0	稍良	118.0
5410.3	9475.0	5817.5	21.4	80.0	97.0	0	3.0	〃	124.5
5468.5	9510.3	5817.5	21.4	80.6	96.0	1.0	3.0	〃	126.0
3981.5	7009.7	4594.1	20.4	80.0	92.0	3.0	5.0	〃	91.8
4338.8	7598.6	5104.5	21.0	80.0	95.0	0	5.0	〃	100.0
4543.0	7998.2	5104.5	21.0	80.0	93.0	0	7.0	〃	104.7
4798.2	8918.6	5104.5	20.0	80.0	94.0	0	6.0	中下	110.6
5206.6	9535.8	5614.9	20.2	80.0	94.0	0	6.0	〃	120.0
4138.1	7734.6	4644.8	20.2	80.0	89.0	1.0	10.0	〃	95.4
4141.6	7543.9	4846.6	20.4	80.0	89.0	2.0	9.0	中	95.5
4698.6	8360.5	5527.8	20.4	80.6	93.0	1.0	6.0	〃	108.3
4698.6	8782.5	5527.8	20.6	80.0	96.0	0	4.0	〃	108.3
5021.1	9281.1	5527.8	20.2	80.0	96.0	0	4.0	中下	115.7
4427.5	8153.8	5390.0	21.0	80.0	90.0	1.0	9.0	中	102.0
4504.5	8295.5	5390.0	20.8	80.6	91.0	1.0	8.0	〃	103.8
4436.9	8126.1	5243.6	20.4	80.0	89.0	2.0	9.0	中上	102.3
4235.0	7799.2	5505.5	20.4	80.0	89.0	2.0	9.0	中	97.6

ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第貳拾參表（g）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	2.20	4.10	6.25	7.25	9.8	101.6	20.2	980.0	24.2	54.6
2	〃	〃	3	〃	〃	6.24	7.24	12.9	100.5	21.3	1290.0	24.4	53.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.25	7.25	13.5	98.3	19.7	1350.0	24.4	52.9
4	〃	〃	5	〃	〃	6.21	7.21	14.5	98.7	19.3	1450.0	24.8	52.6
5	〃	2.0	2	〃	〃	6.25	7.25	11.8	98.0	20.0	955.8	23.8	51.8
6	〃	〃	3	〃	〃	6.24	7.24	13.9	99.3	19.8	1125.9	24.2	52.9
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	14.8	97.1	20.2	1198.8	24.2	52.9
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	16.8	97.7	20.2	1360.8	24.4	52.4
9	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	17.0	98.7	20.0	1377.0	24.2	53.8
10	〃	22	3	〃	〃	6.25	7.25	14.8	99.2	19.3	991.6	24.0	53.2
11	〃	〃	4	〃	〃	6.24	7.24	16.3	99.5	19.9	1092.1	25.0	54.6
12	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.2	98.9	20.5	1152.4	24.0	51.8
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.7	101.1	20.0	1319.9	24.2	54.3
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.4	98.9	20.5	1299.8	24.6	53.8
15	〃	24	4	〃	〃	6.25	7.25	17.8	100.7	19.4	996.8	25.0	55.6
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	19.9	100.1	20.4	1114.4	24.6	55.9
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.4	97.8	19.9	1086.4	24.6	56.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.23	7.23	19.6	100.2	20.1	1097.6	24.8	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	22.1	101.2	20.6	1237.6	24.4	52.6

備考　粒重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3327.4	6094.1	5041.5	20.0	80.5	93.0	1.0	6.0	中下	100.1
3831.5	7161.8	3024.9	20.0	80.0	90.0	1.0	9.0	中	115.2
3932.4	7433.6	5041.5	20.0	80.2	92.0	2.0	6.0	〃	118.3
4436.5	8434.4	5545.7	20.2	80.0	94.0	0	6.0	〃	133.4
2581.5	4983.7	5250.6	19.8	80.0	91.0	1.0	8.0	〃	77.6
3325.4	6286.2	4375.5	20.0	80.0	89.0	4.0	7.0	〃	100.0
3675.4	6947.9	4375.5	20.0	80.2	94.0	1.0	5.0	中下	110.5
3412.9	6513.1	5250.6	20.2	80.0	93.0	1.0	6.0	〃	102.6
4288.0	7970.2	5250.6	20.0	80.0	92.0	0	8.0	〃	128.9
3040.2	5714.7	5067.0	19.6	80.0	87.0	3.0	10.0	〃	91.4
3631.4	6650.8	5067.0	20.4	80.0	90.0	2.0	8.0	〃	109.2
3631.4	7010.3	5067.0	19.6	79.0	90.0	1.0	9.0	〃	109.2
3800.3	6998.6	5067.0	20.0	80.0	90.0	1.0	9.0	〃	114.3
3758.0	6985.2	5489.3	20.0	79.4	90.0	1.0	9.0	〃	113.0
3272.5	5885.8	5390.0	20.4	79.4	91.0	3.0	6.0	〃	98.4
3157.0	5647.6	4620.0	20.4	79.2	89.0	2.0	9.0	下上	94.9
2849.0	5015.8	4620.0	20.2	78.2	96.0	1.0	3.0	中下	85.7
3465.0	6165.5	4620.0	20.2	78.7	94.0	1.0	5.0	〃	104.2
3657.5	6953.4	5390.0	20.2	78.7	93.0	2.0	5.0	下上	110.0

植ヲ１００トセリ

第貳拾四表（g）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時				千粒重量	ヘクトリットル重量
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数		
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	6	18	2	2.20	4.10	6.25	7.25	9.6	97.8	20.0	960.0	24.4	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	12.2	97.1	20.1	1220.0	24.8	55.5
3	〃	〃	4	〃	〃	6.24	7.24	13.4	98.3	19.8	1340.0	24.4	56.8
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.1	99.6	19.2	1310.0	24.4	56.5
5	〃	〃	6	〃	〃	6.23	7.23	15.2	101.3	19.8	1520.0	24.4	55.6
6	〃	20	3	〃	〃	6.25	7.25	13.1	96.5	20.7	1061.1	24.4	52.1
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	15.4	99.6	20.6	1247.4	25.2	55.6
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.0	97.2	19.2	1377.0	25.0	55.6
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.4	97.2	19.6	1328.4	25.0	55.2
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.9	101.7	20.1	1449.9	24.8	56.5
11	〃	22	4	〃	〃	〃	〃	15.6	102.0	20.7	1045.2	24.8	56.8
12	〃	〃	5	〃	〃	6.24	7.24	17.0	97.9	19.1	1139.0	24.8	52.9
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	18.3	102.1	19.8	1226.1	25.0	56.5
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	18.1	98.9	20.4	1212.7	24.4	55.9
15	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	21.3	101.0	21.0	1427.1	25.2	55.6
16	〃	24	5	〃	〃	6.25	7.25	19.1	98.6	19.0	1069.6	24.0	55.6
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	22.6	100.2	19.8	1265.6	24.8	55.9
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	21.2	100.3	19.8	1187.2	24.6	56.8
19	〃	〃	8	〃	〃	6.24	7.24	23.6	99.8	20.2	1288.0	24.4	55.9
20	〃	〃	9	〃	〃	6.25	7.25	21.7	97.1	19.8	1215.2	23.8	54.6

備考　籾重量指数ハ6合播株間20cm一株苗数三本

籾 一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	籾重量指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
2873.7	5168.4	4033.2	20.0	79.5	88.0	2.0	10.0	中下	104.2
2823.2	5086.9	4033.2	20.4	78.2	95.0	0	5.0	下上	102.4
3327.4	5858.1	5041.5	20.0	79.0	90.0	2.0	8.0	〃	120.7
3226.6	5710.7	4033.2	20.0	79.7	96.0	1.0	3.0	〃	117.1
4083.6	7344.6	5041.5	20.2	79.4	95.0	1.0	4.0	〃	148.1
2756.6	5290.9	5250.6	19.8	79.4	83.0	3.0	14.0	〃	100.0
3762.9	6767.9	5250.6	20.6	78.0	93.0	3.0	4.0	〃	136.5
3587.9	6453.1	5250.6	20.4	80.2	96.0	1.0	3.0	〃	130.2
3675.4	6650.4	5250.6	20.4	78.2	91.0	2.0	7.0	中下	133.3
4200.5	7434.5	5688.2	20.2	80.0	93.0	1.0	6.0	〃	152.4
3209.1	5649.8	5067.0	20.4	80.6	96.0	0	4.0	〃	116.4
3378.0	6385.6	4222.5	20.4	79.0	92.0	1.0	7.0	〃	122.5
3631.4	6427.2	4222.5	20.8	78.2	87.0	2.0	11.0	下上	131.7
3293.6	5891.9	4222.5	20.2	78.0	89.0	1.0	10.0	中下	119.5
3715.8	6683.1	5067.0	20.4	79.4	91.0	1.0	8.0	〃	134.8
2887.5	5193.3	5390.0	19.8	79.4	91.0	2.0	7.0	〃	104.7
3542.0	6336.3	4620.0	20.4	78.1	84.0	4.0	12.0	下上	128.5
2772.0	4880.3	4620.0	20.4	78.7	98.0	1.0	1.0	〃	100.6
3234.0	5785.3	4620.0	20.0	78.7	89.0	1.0	10.0	〃	117.3
2618.0	4794.9	5390.0	19.6	78.7	83.0	5.0	12.0	〃	95.0

植ヲ100トセリ

第貳拾五表 (g)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	2.20	4.10	6.30	7.30	11.0	93.9	20.0	1100.0	24.6	55.6
2	〃	〃	4	〃	〃	6.28	7.28	13.4	93.2	18.5	1340.0	24.0	55.2
3	〃	〃	5	〃	〃	6.29	7.29	14.5	94.0	18.8	1450.0	24.6	55.6
4	〃	〃	6	〃	〃	6.29	〃	14.8	90.8	19.5	1480.0	24.0	55.2
5	〃	〃	7	〃	〃	6.28	7.28	14.6	95.5	19.7	1460.0	24.4	55.6
6	〃	20	5	〃	〃	6.29	7.29	13.8	96.4	20.3	1117.8	24.8	55.6
7	〃	〃	6	〃	〃	6.28	7.28	17.8	96.3	18.6	1441.8	24.4	55.0
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	16.5	94.8	18.3	1336.5	23.4	53.2
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	18.0	95.2	18.2	1458.0	24.0	55.0
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	18.8	98.5	18.6	1522.8	24.0	53.8
11	〃	22	6	〃	〃	6.29	7.29	18.1	97.9	19.2	1212.7	24.0	54.6
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	18.7	93.6	17.3	1252.9	24.0	54.2
13	〃	〃	8	〃	〃	6.28	7.28	21.0	94.3	18.6	1407.0	23.8	54.0
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	19.4	96.0	18.6	1299.8	24.6	55.0
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	22.1	97.2	18.8	1480.7	23.6	53.8
16	〃	24	7	〃	〃	6.29	7.29	20.9	98.2	19.9	1170.4	23.8	54.3
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	23.4	96.9	18.8	1310.4	24.4	53.9
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	23.5	96.4	19.3	1316.0	24.0	54.9
19	〃	〃	10	〃	〃	6.28	7.28	22.0	96.9	19.0	1232.0	23.8	53.0
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	29.7	94.5	19.5	1663.2	23.8	53.8

備考　表中空欄ノ部分ハ調査試料不足ノ為調査不能ナリ
籾重量指数ハ8合播株間20cm一株苗数五本植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾			玄					米	籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
2067.0	3717.7	3529.1	20.0	78.0	89.0	2.0	9.0	下上	96.4
2520.8	4566.6	4033.2	19.6		85.0	3.0	12.0	〃	117.6
2924.1	5259.1	4033.2	20.4	77.5	94.0	1.0	5.0	〃	136.4
2621.6	4749.2	4033.2	19.6		87.0	3.0	10.0	〃	122.3
2924.1	5259.1	4537.4	20.2	78.0	95.0	0	5.0	〃	136.4
2144.0	3856.1	4375.5	20.2	77.0	92.0	1.0	7.0	〃	100.0
2450.3	4455.1	4375.5	19.8	77.0	91.0	1.0	8.0	〃	114.3
2275.3	4276.8	4375.5	19.2	77.0	89.0	1.0	10.0	〃	106.1
2275.3	4136.8	3500.4	19.8		95.0	0	5.0	〃	106.1
2581.5	4798.4	5250.6	20.0	77.5	85.0	3.0	12.0	〃	120.4
2322.4	4253.4	5067.0	20.0	78.1	86.0	4.0	10.0	〃	108.3
2533.5	4674.4	4222.5	19.4		83.0	3.0	14.0	〃	118.2
2702.4	5004.4	4222.5	19.4	77.0	90.0	1.0	9.0	稍下	126.0
2702.4	4913.5	4222.5	20.2		85.0	2.0	13.0	下上	126.0
1942.4	3610.3	5489.3	19.2	78.7	87.0	2.0	11.0	〃	90.6
1886.5	3474.2	5390.0	19.4	78.0	84.0	3.0	13.0	中下	88.0
2310.0	4285.7	4620.0	20.4		94.0	1.0	5.0	〃	107.7
2772.0	5049.2	4620.0	19.8	77.0	86.0	2.0	12.0	〃	129.3
2387.0	4508.3	3850.0	19.4		94.0	1.0	5.0	〃	111.3
1732.5	3220.3	2695.0	19.2	77.0	93.0	0	7.0	下上	80.8

第貳拾六表 (九)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	2	18	1	2.29	3.31	6.18	7.17	9.3	100.9	21.3	930.0	25.6	56.8
2	〃	〃	2	〃	〃	6.16	7.16	11.3	99.9	19.8	1130.0	25.0	57.1
3	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	11.3	98.3	19.1	1130.0	25.2	56.5
4	〃	〃	4	〃	〃	6.14	7.14	13.1	98.7	19.0	1310.0	25.8	55.9
5	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	14.1	97.6	18.7	1410.0	25.4	56.8
6	〃	20	2	〃	〃	6.17	7.17	11.8	97.8	20.1	955.8	25.4	56.8
7	〃	〃	3	〃	〃	6.16	7.16	12.5	98.6	19.4	1012.5	25.0	56.5
8	〃	〃	4	〃	〃	6.14	7.14	14.2	99.4	18.3	1150.2	25.2	57.1
9	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	13.6	98.5	19.1	1101.6	25.6	55.2
10	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.9	100.3	19.0	1368.9	25.2	56.5
11	〃	22	3	〃	〃	6.17	7.17	14.5	100.8	20.5	971.5	25.6	54.3
12	〃	〃	4	〃	〃	6.16	7.16	15.6	99.6	20.4	1045.2	25.2	53.8
13	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.3	100.4	20.3	1159.1	25.4	54.3
14	〃	〃	6	〃	〃	6.13	7.13	16.6	99.3	19.5	1112.2	25.6	54.3
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.3	98.5	19.2	1293.1	25.2	55.6
16	〃	24	5	〃	〃	6.16	7.16	18.7	100.6	19.2	1047.2	25.2	54.3
17	〃	〃	6	〃	〃	6.14	7.14	19.1	99.4	19.7	1069.6	25.6	55.9
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.3	99.6	18.7	1136.8	25.2	54.3
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	22.4	100.5	19.1	1254.4	25.4	54.9

備考 籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4244.7	7473.1	4391.1	21.2	81.3	94.0	1.0	5.0	稍良	103.9
4726.5	8277.6	3781.2	21.0	81.7	98.0	0	2.0	〃	115.7
4821.0	8532.8	4726.5	21.0	81.5	93.0	2.0	5.0	中上	118.1
4253.9	7609.8	3781.2	21.4	81.7	92.0	2.0	6.0	稍良	104.2
4017.5	7073.1	4726.5	21.2	82.0	93.0	2.0	5.0	〃	98.4
3839.0	6758.7	3267.2	21.2	82.0	94.0	2.0	4.0	〃	94.0
4083.8	7227.9	4083.8	21.0	81.5	93.0	2.0	5.0	〃	100.0
4002.1	7008.9	4083.8	21.0	81.0	97.0	0	3.0	中上	98.0
4492.1	8137.9	4083.8	21.4	81.0	96.0	0	4.0	〃	110.0
4326.2	7657.0	4594.2	21.0	82.0	93.0	0	7.0	稍良	105.9
3986.0	7340.8	3378.0	21.4	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	97.6
4188.7	7785.7	4729.2	20.8	81.3	95.0	2.0	3.0	中上	102.6
3445.6	6345.4	3378.0	20.8	81.3	92.0	1.0	7.0	〃	84.4
3918.5	7216.4	3378.0	21.4	81.3	94.0	1.0	5.0	〃	96.0
4290.1	7715.9	4391.4	21.0	82.0	95.0	1.0	4.0	〃	105.1
4234.8	7798.8	3909.0	20.8	81.3	98.0	0	2.0	〃	103.7
3909.3	6993.4	3257.8	21.2	81.3	95.0	1.0	4.0	稍良	95.7
4039.6	7439.4	3909.3	21.0	82.0	96.0	1.0	3.0	中上	98.9
4202.2	7654.2	4234.8	20.8	82.0	96.0	1.0	3.0	稍良	102.9

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第貳拾七表（h）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫時 穂数	収穫時 草丈	収穫時 穂長	収穫時 坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	2.29	3.31	6.19	7.19	9.3	100.4	19.8	930.0	25.4	54.3
2	〃	〃	3	〃	〃	6.17	7.17	13.0	100.5	19.1	1300.0	25.2	55.2
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	10.9	98.5	19.2	1090.0	25.0	54.3
4	〃	〃	5	〃	〃	6.16	7.16	14.3	96.9	16.8	1430.0	25.6	55.6
5	〃	20	2	〃	〃	6.17	7.17	11.0	98.6	19.4	891.0	25.4	55.6
6	〃	〃	3	〃	〃	6.18	7.18	11.4	100.2	19.7	923.4	25.4	54.1
7	〃	〃	4	〃	〃	6.17	7.17	13.4	96.6	20.1	1085.4	25.4	54.9
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.4	97.1	19.7	1247.4	25.4	55.6
9	〃	〃	6	〃	〃	6.16	7.16	15.3	97.8	19.9	1239.3	25.4	54.3
10	〃	22	3	〃	〃	6.19	7.19	13.0	100.3	18.3	871.0	25.6	54.3
11	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	14.3	100.3	19.0	958.1	25.8	55.6
12	〃	〃	5	〃	〃	6.16	7.16	16.0	97.7	18.8	1072.0	25.6	55.9
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	16.9	97.4	19.7	1132.3	25.4	54.6
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.4	97.7	18.2	1289.8	25.2	54.9
15	〃	24	4	〃	〃	6.19	7.19	16.4	100.5	18.3	918.4	25.4	54.3
16	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	17.6	98.7	19.9	985.6	24.8	54.9
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	19.5	98.9	20.4	1092.0	24.6	56.5
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	20.5	98.4	18.2	1148.0	25.0	54.9
19	〃	〃	8	〃	〃	6.18	7.18	21.0	99.9	19.7	1176.0	24.4	52.6

備考 籾重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数三本

籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリツトル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4003.7	7373.2	3114.0	21.2	81.3	96.0	1.0	3.0	稍良	111.2
4537.5	8220.1	3558.8	20.8	82.0	94.0	0	6.0	〃	126.1
3914.7	7209.4	3558.8	20.8	81.0	92.0	0	8.0	中上	108.8
4359.5	7840.9	3114.0	21.0	81.3	97.0	1.0	2.0	〃	121.1
3793.9	6823.6	3556.8	21.0	81.3	98.0	0	2.0	〃	105.4
3598.8	6652.1	3062.8	20.8	82.0	98.0	0	2.0	〃	100.0
4134.8	7531.5	3828.5	20.8	81.3	98.0	0	2.0	〃	114.9
3675.4	6610.4	3828.5	20.8	81.3	93.0	1.0	6.0	〃	102.1
4211.4	7755.7	3062.8	21.2	80.6	95.0	0	5.0	〃	117.0
3619.0	6664.8	3257.1	21.0	80.6	92.0	0	8.0	〃	100.6
4270.7	7681.1	3619.3	21.4	80.6	92.0	1.0	7.0	〃	118.7
3908.8	6992.5	3619.3	21.0	81.3	97.0	0	3.0	〃	108.6
3981.2	7291.5	3619.3	21.0	80.6	93.0	0	7.0	〃	110.6
4234.2	7712.6	3619.0	20.8	80.0	96.0	0	4.0	中	117.7
3485.5	6419.0	3257.5	21.0	80.6	96.0	0	4.0	〃	96.9
3453.2	6290.0	3257.8	20.4	80.0	96.0	0	4.0	〃	96.0
3192.6	5650.6	3257.8	20.2	80.5	94.0	1.0	5.0	中下	88.7
2997.1	5459.3	3257.8	20.4	80.5	95.0	0	5.0	中	83.3
3355.2	6378.8	3909.0	20.0	80.0	89.0	2.0	9.0	〃	93.2

値ヲ100トセリ

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

第貳拾八表（九）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	6	18	2	2.29	3.31	6.20	7.20	11.7	102.6	20.2	1170.0	25.2	53.5
2	〃	〃	3	〃	〃	6.19	7.19	10.9	101.3	20.6	1090.0	25.4	55.9
3	〃	〃	4	〃	〃	6.18	7.18	13.2	102.9	19.7	1320.0	25.4	54.9
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.5	101.2	20.0	1250.0	25.4	56.2
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.6	99.0	19.6	1460.0	25.4	54.9
6	〃	20	3	〃	〃	6.19	7.19	13.3	99.0	19.4	1077.3	25.8	57.1
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	14.1	96.9	19.8	1142.1	24.6	54.3
8	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	15.4	94.6	19.5	1247.4	25.0	55.9
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	15.3	92.3	19.7	1239.3	24.6	57.1
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.8	94.0	19.6	1441.8	25.0	55.6
11	〃	22	4	〃	〃	〃	〃	15.0	97.4	19.8	1005.0	25.0	57.8
12	〃	〃	5	〃	〃	6.18	7.18	16.7	96.1	18.6	1118.9	25.6	56.5
13	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	18.6	95.8	19.6	1246.2	25.4	55.9
14	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	17.3	94.6	19.0	1159.1	25.6	57.1
15	〃	〃	8	〃	〃	6.16	7.16	20.5	99.8	18.4	1373.5	25.6	57.5
16	〃	24	5	〃	〃	6.19	7.19	18.5	99.0	19.8	1036.0	25.6	57.5
17	〃	〃	6	〃	〃	6.18	7.18	19.3	97.8	18.4	1080.8	25.2	55.9
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	19.5	96.3	19.3	1092.0	25.2	57.8
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	19.9	95.9	19.4	1114.4	26.0	58.1
20	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	20.3	94.4	18.4	1136.8	25.6	57.1

備考 籾重量指数ハ6合播株間20cm一株苗数三本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄			米			籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4759.9	8897.0	4893.4	20.8	81.3	90.0	2.0	8.0	中	128.2
4715.4	8435.4	3558.8	20.8	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	127.0
4982.3	9075.3	4448.5	20.8	81.3	96.0	0	4.0	〃	134.2
4804.4	8548.7	4448.5	20.8	80.6	94.0	2.0	4.0	中上	129.4
5026.8	9156.3	4448.5	20.8	82.0	94.0	1.0	5.0	〃	135.4
3713.6	6503.8	3445.7	21.2	81.5	98.0	1.0	1.0	〃	100.0
3981.6	7332.7	3828.5	20.2	81.5	93.0	1.0	6.0	〃	107.2
3215.9	5753.0	3062.8	20.8	81.5	95.0	2.0	3.0	稍良	86.6
3757.1	6579.8	3267.0	20.4	81.3	97.0	0	3.0	中上	101.2
4287.9	7712.1	3828.5	20.6	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	115.5
3619.0	6261.2	3257.1	20.8	82.0	97.0	1.0	2.0	〃	97.5
4343.1	7686.9	3619.3	21.0	81.3	96.0	0	4.0	〃	116.9
4343.1	7769.4	3619.3	20.8	81.3	95.0	2.0	3.0	稍良	116.9
4415.5	7732.9	4343.1	21.0	81.3	97.0	1.0	2.0	〃	118.9
4994.2	8685.6	4342.8	20.8	81.3	95.0	2.0	3.0	中上	134.5
4104.5	7138.2	3257.5	21.0	81.3	96.0	2.0	2.0	〃	110.5
4039.6	7226.5	3257.8	20.6	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	108.8
4104.8	7101.7	3909.3	20.6	81.3	98.0	0	2.0	稍良	110.5
4169.9	7177.1	3257.8	21.8	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	112.3
3811.3	6674.7	3257.5	21.0	81.3	96.0	0	4.0	中上	102.6

植ヲ100トセリ

第貳拾九表 (h)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	8	18	3	2.29	3.31	6.19	7.19	11.2	93.8	18.5	1120.0	25.4	56.8
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	11.4	92.3	18.7	1140.0	25.0	55.9
3	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	12.1	89.5	17.5	1210.0	25.4	57.5
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.5	90.2	18.1	1350.0	25.4	57.5
5	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	14.9	88.9	18.0	1490.0	25.0	57.8
6	〃	20	5	〃	〃	〃	〃	14.4	90.7	18.7	1166.4	25.6	57.5
7	〃	〃	6	〃	〃	6.18	7.18	15.7	90.9	18.0	1271.7	25.2	57.5
8	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.2	90.6	18.4	1231.2	25.4	57.8
9	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	16.1	90.8	18.2	1304.1	25.6	58.1
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	18.5	91.7	18.3	1498.5	25.6	58.8
11	〃	22	6	〃	〃	6.19	7.19	16.0	93.8	18.9	1072.0	25.2	58.1
12	〃	〃	7	〃	〃	6.18	7.18	18.7	95.2	19.2	1252.9	25.0	57.5
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	17.8	94.2	18.7	1192.6	25.2	58.5
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	19.9	94.2	18.7	1333.3	25.2	57.1
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	20.3	95.3	18.8	1360.1	25.0	57.8
16	〃	24	7	〃	〃	6.19	7.19	18.4	95.0	18.6	1030.4	25.0	57.1
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	17.9	93.9	17.5	1002.4	25.6	58.8
18	〃	〃	9	〃	〃	6.18	7.18	21.0	95.9	18.6	1176.0	26.0	57.8
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	20.7	95.2	18.8	1159.2	26.0	57.8
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	22.8	98.5	18.8	1276.8	25.8	57.5

備考 籾重量指数ハ8合播株間20cm一株苗数五本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3959.2	6970.4	3114.0	21.0	81.3	96.0	2.0	2.0	中	103.0
3914.7	7003.0	3558.8	21.0	81.3	97.0	1.0	2.0	〃	101.8
3469.8	6034.5	3558.8	21.2	81.5	95.0	2.0	3.0	〃	90.3
4003.7	6962.9	3558.8	21.2	81.5	96.0	2.0	2.0	〃	104.1
5115.8	8850.8	4003.7	21.0	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	133.1
3844.3	6685.7	3379.6	21.4	81.3	93.0	2.0	5.0	中上	100.0
4410.5	7670.3	3267.0	21.0	81.0	97.0	1.0	2.0	稍良	114.7
4083.8	7065.3	4083.8	21.2	81.3	95.0	1.0	4.0	中上	106.0
4247.1	7310.0	4083.8	21.0	81.3	97.0	0	3.0	稍良	110.5
4614.9	7848.5	4900.8	21.0	81.3	97.0	0	3.0	〃	120.0
3939.5	6775.3	3897.5	20.6	80.6	96.0	1.0	3.0	中上	102.4
4443.2	7727.2	3897.5	20.4	81.3	96.0	0	4.0	中	115.6
4053.4	6928.9	3897.5	20.4	82.0	95.0	1.0	4.0	中上	105.4
4287.3	7508.3	3897.5	21.0	82.0	95.0	2.0	3.0	〃	111.5
4560.1	7889.4	3118.0	20.4	82.0	93.0	3.0	4.0	〃	118.6
4093.6	7169.2	3176.1	21.0	81.3	94.0	1.0	5.0	〃	106.5
3741.0	6362.3	3529.3	21.4	81.3	94.0	2.0	4.0	〃	97.3
4305.7	7449.3	3529.3	21.4	81.3	93.0	3.0	4.0	〃	112.0
3952.5	6838.2	3881.9	21.6	81.3	93.0	1.0	4.0	稍良	102.8
5011.5	8715.7	4235.1	21.4	80.6	94.0	2.0	4.0	〃	130.4

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第参拾表（直播）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	直播	18	1	直播 9.12	直播	6.24	7.22	6.4	93.3	19.9	640.0	28.0	61.0
2	〃	〃	2	〃	〃	6.22	7.22	6.3	89.2	20.2	630.0	28.4	61.0
3	〃	〃	3	〃	〃	6.21	7.21	8.2	88.3	19.4	820.0	27.6	60.2
4	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	8.4	85.3	18.0	840.0	28.2	60.6
5	〃	〃	5	〃	〃	6.18	7.18	7.6	84.1	17.5	760.0	28.4	60.2
6	〃	20	2	〃	〃	6.21	7.21	7.5	87.2	19.3	607.5	28.0	59.5
7	〃	〃	3	〃	〃	6.18	7.18	9.4	87.2	18.3	761.0	27.8	59.2
8	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	9.8	87.4	18.8	793.8	28.0	59.2
9	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	9.0	83.9	18.9	729.0	28.0	60.2
10	〃	〃	6	〃	〃	6.15	7.15	10.1	85.9	18.7	818.0	28.0	59.5
11	〃	22	3	〃	〃	6.22	7.22	10.7	90.0	19.7	716.9	27.4	58.8
12	〃	〃	4	〃	〃	6.20	7.20	12.5	92.9	19.0	837.5	27.6	58.1
13	〃	〃	5	〃	〃	6.19	7.19	12.6	90.4	18.7	844.2	28.0	59.2
14	〃	〃	6	〃	〃	6.18	7.18	13.9	89.7	19.3	931.3	27.6	58.8
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	12.8	88.4	19.4	857.6	28.0	58.1
16	〃	24	5	〃	〃	6.24	7.22	11.8	89.0	19.1	660.8	27.2	58.5
17	〃	〃	6	〃	〃	6.22	7.22	13.1	87.3	18.7	733.6	27.4	58.8
18	〃	〃	7	〃	〃	6.22	〃	12.4	85.8	19.9	694.4	27.8	58.8
19	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	12.9	85.6	18.6	722.4	27.2	58.8

備考　粎重量指数ハ直播株間20cm一株苗数三本植

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3600.3	5902.2	3428.9	23.2	81.3	96.0	2.0	2.0	良	113.9
3158.0	5177.0	3214.7	23.6	81.3	96.0	1.0	3.0	〃	99.9
3284.7	5456.3	3457.6	23.4	81.3	99.0	0	1.0	〃	103.9
3025.5	4992.6	3227.2	23.4	81.3	98.0	0	2.0	〃	95.7
3025.5	5025.7	2017.0	23.6	81.3	99.0	0	1.0	〃	95.7
2907.8	4887.0	2723.0	23.2	80.6	98.0	1.0	1.0	〃	92.0
3161.9	5341.1	2931.6	23.4	81.3	98.0	1.0	1.0	〃	100.0
3078.2	5199.6	3141.0	23.4	80.6	99.0	0	1.0	〃	97.4
2931.6	4869.8	3141.0	23.4	81.3	98.0	0	2.0	〃	92.7
2946.7	4952.4	2917.5	23.2	82.0	99.0	0	1.0	〃	93.2
2980.1	5068.1	3016.3	23.2	82.0	98.0	1.0	1.0	〃	94.2
3395.3	5843.9	3421.6	23.2	82.0	97.0	1.0	2.0	稍良	107.4
3040.4	5135.8	2895.6	23.4	80.6	98.0	0	2.0	〃	96.2
3197.2	5437.5	3257.6	23.0	81.3	98.0	0	2.0	良	101.1
3221.4	5544.5	3016.3	23.2	81.3	96.0	1.0	3.0	稍良	101.9
2515.7	4300.3	2567.0	22.8	80.6	93.0	3.0	4.0	〃	79.6
2851.2	4849.0	2851.2	22.6	80.6	94.0	2.0	4.0	〃	90.2
2670.7	4541.9	2588.3	23.0	81.3	95.0	1.0	4.0	〃	84.5
2400.1	4081.7	2353.0	22.4	81.3	95.0	2.0	3.0	良	75.9

ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第参拾壹表（直播）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時					
								穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	直播	18	1	直播 3.20	直播	6.29	7.29	7.7	92.5	19.3	770.0	27.0	58.8
2	〃	〃	2	〃	〃	〃	〃	8.9	95.2	19.8	890.0	27.2	59.5
3	〃	〃	3	〃	〃	6.28	7.28	9.2	92.5	20.3	920.0	27.2	58.8
4	〃	〃	4	〃	〃	6.27	7.27	10.5	95.5	19.0	1050.0	27.2	58.8
5	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	10.3	93.7	18.4	1030.0	27.2	58.5
6	〃	20	2	〃	〃	6.29	7.28	9.6	93.4	20.5	777.6	27.2	58.1
7	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	10.0	95.6	19.4	810.0	27.8	57.5
8	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	10.9	90.7	19.6	862.9	27.2	58.8
9	〃	〃	5	〃	〃	6.28	〃	12.0	93.0	18.4	972.0	26.8	57.8
10	〃	〃	6	〃	〃	6.27	7.27	11.9	92.6	18.9	963.9	27.0	59.2
11	〃	22	3	〃	〃	6.29	7.28	12.1	93.2	19.7	810.7	27.0	58.8
12	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	12.0	91.6	18.9	804.0	26.8	58.8
13	〃	〃	5	〃	〃	6.27	7.27	13.0	92.9	19.2	871.0	27.6	58.1
14	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	13.6	91.5	19.3	911.2	27.2	58.1
15	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	13.7	90.2	19.1	917.9	27.8	58.1
16	〃	24	5	〃	〃	6.29	7.28	14.3	90.0	19.3	800.8	27.4	58.8
17	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	14.0	88.6	18.6	784.0	26.2	57.1
18	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	15.4	87.5	19.6	862.4	26.2	56.2
19	〃	〃	8	〃	〃	6.27	7.27	15.5	90.3	19.6	868.0	26.8	57.8

備考 粒重量指数ハ直播株間20cm一株苗数三本植

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
3044.1	5177.0	3829.0	22.4	80.0	92.0	6.0	2.0	稍良	105.3
3213.9	5401.4	4159.1	22.6	80.0	92.0	4.0	4.0	〃	111.2
3346.2	5690.8	4159.1	23.0	80.0	92.0	4.0	4.0	〃	115.7
3119.3	5305.0	4537.2	23.0	80.6	91.0	7.0	2.0	〃	107.9
3384.0	5784.6	4159.1	22.4	80.6	92.0	4.0	4.0	〃	117.1
3044.1	5239.3	3446.1	22.6	80.6	92.0	6.0	2.0	中上	105.3
2890.9	5027.6	3829.0	23.0	80.6	90.0	8.0	2.0	〃	100.0
3005.8	5111.8	4211.9	22.4	80.6	88.0	8.0	4.0	〃	104.0
3044.1	5266.5	4211.9	22.0	81.3	90.0	7.0	3.0	稍良	105.3
3120.6	5271.3	4403.4	22.2	80.0	92.0	3.0	5.0	中上	107.9
2623.8	4462.2	3800.0	22.2	80.0	86.0	10.0	4.0	〃	90.6
2587.6	4400.7	3980.9	22.2	80.6	89.0	9.0	2.0	〃	89.5
3003.8	5170.0	3980.9	22.8	80.0	93.0	5.0	2.0	〃	103.9
2840.9	4889.7	3619.0	22.4	80.0	91.0	6.0	3.0	〃	98.3
2931.4	5045.4	3619.0	23.0	80.0	96.0	3.0	1.0	稍良	101.4
2576.2	4381.2	3529.0	22.6	80.6	93.0	5.0	2.0	中上	89.1
2364.4	4140.9	3881.9	22.0	80.0	91.0	7.0	2.0	〃	81.8
2364.8	4169.8	3176.1	22.0	80.0	85.0	11.0	4.0	中	81.2
2840.8	4915.0	3881.9	22.0	80.0	92.0	5.0	3.0	中上	98.3

ヲ100トセリ

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

第二期作

標準肥料區

第　二
第　一

標準肥料區

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	収穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	2	18	2	7.11	7.25	10.8	11.12	5.5	98.4	21.4	550.0	27.4	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	6.3	96.9	20.9	630.0	27.4	55.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	7.0	96.1	20.8	700.0	27.4	55.9
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	6.6	97.1	21.2	660.0	26.8	55.6
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	7.0	97.4	21.4	700.0	27.4	55.9
6	〃	20	3	〃	〃	10.10	11.14	6.9	96.4	22.2	558.9	26.8	54.6
7	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	7.0	97.5	20.4	567.0	26.6	54.9
8	〃	〃	5	〃	〃	10.9	11.13	7.7	95.9	20.2	623.7	26.8	55.9
9	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	7.5	94.6	21.2	607.5	27.0	55.2
10	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.8	94.6	20.4	631.8	26.8	55.2
11	〃	22	5	〃	〃	10.10	11.14	8.4	96.1	20.2	562.8	27.0	54.9
12	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	8.0	96.1	20.8	536.0	27.0	56.2
13	〃	〃	7	〃	〃	10.9	11.13	8.0	97.6	22.3	536.0	27.4	54.9
14	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	8.6	95.7	21.7	576.2	27.6	55.9
15	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	8.8	95.0	21.3	589.6	27.0	55.6
16	〃	24	6	〃	〃	10.10	11.14	8.4	98.8	21.0	470.4	27.0	55.6
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	9.6	97.4	21.4	537.6	26.8	54.3
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	9.7	96.8	22.2	543.2	27.6	55.6
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	10.2	96.8	20.9	571.2	26.4	54.1

備考　籾重量指数ハ2合播株間20cm一株苗数三本

期　作

表（A）

籾		一ヘクタール	玄				米		籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4159.7	7481.4	3781.5	23.6	81.3	89.0	9.0	2.0	中上	105.7
4411.8	7892.2	4285.7	23.0	80.6	88.0	10.0	2.0	〃	112.1
4815.1	8613.8	4285.7	23.4	80.6	93.0	6.0	1.0	〃	122.4
4487.4	8070.8	4285.7	22.4	81.3	90.0	9.0	1.0	〃	114.1
4966.4	8884.4	4789.9	23.0	79.4	90.0	8.0	2.0	〃	126.2
3934.5	7206.1	3769.6	22.4	79.4	88.0	11.0	1.0	中	100.0
4005.2	7295.4	4005.2	22.4	79.4	91.0	8.0	1.0	中上	101.8
4311.5	7712.8	3769.6	22.4	79.4	89.0	11.0	0	中	109.6
4075.9	7383.8	4005.2	22.8	78.7	88.0	11.0	1.0	〃	103.6
4170.1	7554.6	4005.2	22.8	80.0	89.0	10.0	1.0	中上	106.0
3905.4	7113.6	3588.7	22.6	79.4	85.0	13.0	2.0	〃	99.3
3673.1	6535.8	3588.7	22.8	80.0	88.0	11.0	1.0	〃	93.4
3905.4	7113.6	3588.7	23.0	80.0	91.0	9.0	0	〃	99.3
3863.1	6910.8	3799.8	23.4	79.4	86.0	12.0	2.0	稍良	98.2
3715.4	66.82.3	3588.7	23.0	78.7	92.0	7.0	1.0	中上	94.4
3370.2	6061.5	3352.6	23.0	78.7	91.0	8.0	1.0	〃	85.7
3705.5	6824.0	3529.0	22.4	80.0	90.0	10.0	0	稍良	94.2
3705.5	6664.5	3529.0	23.0	78.7	91.0	9.0	0	〃	94.2
4587.7	8480.0	4411.3	22.4	80.0	89.0	10.0	1.0	〃	116.6

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第二表（A）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	7.11	7.25	10.15	11.19	5.2	94.1	20.9	520.0	27.0	54.6
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	6.0	96.3	20.9	600.0	27.0	55.6
3	〃	〃	4	〃	〃	10.13	11.17	6.0	94.3	20.5	600.0	27.6	56.5
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	5.6	94.9	20.2	560.0	27.0	55.2
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	6.0	95.7	20.5	600.0	27.0	54.6
6	〃	〃	7	〃	〃	10.12	11.16	6.8	93.1	20.4	680.0	27.4	56.2
7	〃	20	2	〃	〃	10.16	11.19	6.2	98.8	20.2	502.2	27.0	55.9
8	〃	〃	3	〃	〃	10.14	11.18	6.6	98.1	19.9	534.6	26.8	55.6
9	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	6.7	98.8	20.1	542.7	26.4	55.9
10	〃	〃	5	〃	〃	10.12	11.16	6.7	96.0	20.8	542.7	27.4	55.2
11	〃	〃	6	〃	〃	10.14	11.18	7.0	97.5	21.7	567.0	26.8	55.2
12	〃	〃	7	〃	〃	10.12	11.16	7.4	95.0	21.4	599.4	26.8	54.9
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	8.1	94.5	20.9	656.1	26.8	55.6
14	〃	22	5	〃	〃	10.16	11.19	7.7	97.2	19.5	515.9	27.0	55.2
15	〃	〃	6	〃	〃	10.13	11.17	7.4	98.5	20.2	495.8	27.4	55.6
16	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	8.0	97.8	19.8	536.0	27.2	55.6
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	8.4	99.3	19.9	562.8	26.6	54.9
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	9.2	94.2	20.2	616.4	27.0	55.6
19	〃	24	6	〃	〃	10.15	11.19	9.1	100.0	19.2	509.6	27.2	55.9
20	〃	〃	8	〃	〃	10.14	11.18	9.3	97.7	19.8	520.8	27.2	55.6
21	〃	〃	9	〃	〃	10.13	11.17	9.5	96.7	20.2	532.0	27.4	55.6
22	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	10.5	95.9	19.9	588.0	27.6	56.5
23	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	10.5	96.1	19.8	588.0	27.2	55.6

備考　粒重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数3本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3875.7	7098.4	3938.8	23.0	80.0	90.0	10.0	0	中上	105.5
4325.2	7779.1	3545.3	22.8	80.6	89.0	11.0	0	稍良	117.7
4065.2	7195.1	3781.6	23.6	80.0	92.0	7.0	1.0	〃	110.6
3639.8	6593.8	3545.3	22.6	80.0	90.0	10.0	0	中上	99.0
3899.8	7142.4	3545.3	22.4	79.4	91.0	9.0	0	稍良	106.1
4136.1	7359.7	4490.7	22.8	80.0	88.0	10.0	2.0	〃	112.5
3740.6	6691.6	3281.3	22.8	80.0	91.0	9.0	0	中上	101.8
3675.0	6609.7	3500.0	22.4	80.0	87.0	10.0	3.0	中	100.0
3784.4	6769.9	3281.3	22.4	80.6	87.0	12.0	1.0	〃	103.0
3828.1	6935.0	3500.0	22.6	80.6	92.0	8.0	0	〃	104.2
3959.4	7172.8	3718.8	22.4	80.6	91.0	9.0	0	中下	107.7
4068.8	7411.2	3937.5	22.6	80.6	87.0	11.0	2.0	〃	110.7
4003.1	7199.9	4156.3	22.4	80.0	88.0	11.0	1.0	中	108.9
3644.6	6602.6	3703.1	22.4	80.0	89.0	9.0	2.0	〃	99.2
3566.7	6414.9	3508.2	23.0	80.6	88.0	11.0	1.0	中下	97.1
3625.1	6520.0	3508.2	23.0	80.6	90.0	9.0	1.0	中	98.6
3664.1	6674.2	3898.0	22.4	80.6	89.0	10.0	1.0	中上	99.7
3664.1	6590.1	3703.1	22.6	80.6	87.0	11.0	2.0	中	99.7
3440.8	6155.2	3352.6	22.8	79.4	82.0	17.0	1.0	中上	93.6
3476.1	6251.9	3176.1	22.8	80.0	88.0	11.0	1.0	〃	94.6
3458.4	6220.2	3176.1	22.8	80.0	89.0	10.0	1.0	稍良	94.1
3634.9	6433.4	3352.6	23.0	80.0	91.0	8.0	1.0	〃	98.9
3546.6	6378.9	3352.6	22.8	80.0	85.0	14.0	1.0	中上	96.5

植ヲ100トセリ

第 三 表 (A)

番號	播種期	株間	苗数	插植期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	6	18	3	7.11	7.25	10.10	11.14	6.7	95.6	20.2	670.0	27.2	55.6
2	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	7.2	96.0	19.6	720.0	26.4	54.3
3	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	7.0	91.3	19.1	700.0	27.2	56.5
4	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	6.9	92.2	18.1	690.0	26.8	55.9
5	〃	〃	7	〃	〃	10.12	11.16	7.9	90.2	18.7	790.0	27.0	56.5
6	〃	20	5	〃	〃	10.14	11.18	7.8	93.8	19.4	631.8	27.4	56.2
7	〃	〃	6	〃	〃	10.13	11.17	8.5	93.5	19.7	688.5	27.4	54.9
8	〃	〃	7	〃	〃	10.14	11.18	8.8	91.2	19.3	712.8	26.4	55.9
9	〃	〃	8	〃	〃	10.13	11.17	8.8	93.3	18.3	712.8	27.0	55.9
10	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	9.3	92.2	19.2	753.3	26.8	55.9
11	〃	22	6	〃	〃	10.16	11.19	8.9	93.7	19.2	596.3	26.0	55.2
12	〃	〃	7	〃	〃	10.15	〃	9.4	92.5	18.8	629.8	26.0	54.6
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	9.8	92.7	19.5	656.6	27.0	56.2
14	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	10.0	93.7	19.2	670.0	27.0	55.9
15	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	10.7	91.5	19.6	716.9	26.6	55.6
16	〃	24	7	〃	〃	10.16	〃	10.2	94.8	19.3	571.2	26.8	55.6
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	10.8	96.5	19.5	604.8	26.4	56.2
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	11.4	94.7	19.5	638.4	27.2	55.6
19	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	12.2	93.6	18.4	683.2	26.0	55.6
20	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	12.0	94.9	19.9	672.0	26.6	55.6

備考 籾重量指数ハ6合播株間20cm一株苗数5本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

籾		一ヘクタール	玄		米				籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4512.6	8116.2	3529.4	22.8	80.0	90.0	9.0	1.0	中	109.4
4386.5	8078.3	4033.6	22.0	79.4	87.0	12.0	1.0	稍良	106.4
4184.9	7406.8	4033.6	22.6	80.6	91.0	9.0	0	中	101.5
3831.9	6855.0	3529.4	22.6	80.0	88.0	11.0	1.0	中上	92.9
4210.1	7451.5	4537.8	22.6	80.6	88.0	11.0	1.0	〃	102.1
4123.0	7336.3	3298.4	22.8	79.4	88.0	11.0	1.0	〃	100.0
4099.4	7467.1	3769.6	23.0	79.4	88.0	11.0	1.0	中	99.4
3981.6	7122.8	3298.4	22.2	80.6	89.0	10.0	1.0	稍良	96.6
4099.4	7333.5	3769.6	22.8	80.6	89.0	10.0	1.0	中上	99.4
3981.6	7122.8	3769.6	22.4	81.3	92.0	6.0	2.0	〃	96.6
3483.2	6310.1	3799.8	22.0	80.6	87.0	12.0	1.0	中	84.5
3778.7	6920.7	4222.0	22.0	80.6	85.0	14.0	1.0	〃	91.6
3863.1	6873.9	3377.6	22.4	80.6	86.0	14.0	0	中上	93.7
3884.2	6948.6	3799.8	22.4	80.6	89.0	11.0	0	〃	94.2
3947.6	7099.9	3799.8	22.4	81.3	90.0	10.0	0	中	95.7
3676.8	6612.9	3465.0	22.2	81.3	90.0	10.0	0	〃	89.2
3696.0	6576.5	3465.0	22.0	82.0	89.0	11.0	0	〃	89.6
3773.0	6786.0	3465.0	22.6	80.6	85.0	15.0	0	〃	91.5
3696.0	6647.5	3465.0	22.0	80.6	95.0	5.0	0	中上	89.6
3670.8	6602.2	3593.8	22.4	81.3	92.0	8.0	0	稍良	89.0

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第 四 表 （A）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	8	18	4	7.11	7.25	10.18	11.20	6.6	93.0	19.3	660.0	26.6	56.8
2	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	6.6	93.1	18.7	660.0	27.0	55.6
3	〃	〃	6	〃	〃	10.17	11.19	6.7	93.5	18.8	670.0	27.0	56.5
4	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.3	92.5	18.2	730.0	27.0	55.6
5	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	7.7	93.0	18.9	770.0	27.0	56.8
6	〃	20	5	〃	〃	10.18	11.20	7.6	94.0	18.5	615.6	26.6	55.6
7	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	8.1	93.9	19.3	656.1	27.4	56.2
8	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	8.2	94.2	18.9	664.2	27.0	55.6
9	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	9.0	90.8	19.1	729.0	27.2	55.6
10	〃	22	6	〃	〃	〃	〃	8.7	93.7	19.1	582.9	27.4	56.5
11	〃	〃	7	〃	〃	10.19	11.21	9.1	91.7	18.9	609.7	27.0	55.6
12	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	9.3	92.0	19.2	623.1	27.4	56.2
13	〃	〃	9	〃	〃	10.18	11.20	9.5	91.9	19.1	636.5	27.0	56.5
14	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	9.8	91.9	18.5	656.6	27.4	55.2
15	〃	24	7	〃	〃	10.19	11.21	10.5	93.3	18.0	580.0	27.2	57.1
16	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	10.8	93.1	19.3	604.8	27.6	57.1
17	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	11.2	91.5	19.4	627.2	27.0	55.9

備考 籾重量指数ハ 8 合播株間 20cm 一株苗数 5 本

農業部農業試驗所 1895 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

籾		一ヘクタール	玄		米				籾重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	指数
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
3848.3	6775.3	3361.0	22.4	80.6	84.0	16.0	0	中上	104.1
4008.4	7209.3	3529.4	22.4	80.6	94.0	6.0	0	〃	108.4
3932.8	6960.6	3529.4	22.8	80.6	92.0	8.0	0	稍良	106.4
3882.3	6982.6	3529.4	22.4	80.6	89.0	10.0	1.0	中上	105.0
4109.2	7234.6	3529.4	22.6	80.6	87.0	13.0	0	稍良	111.2
3696.9	6649.1	3500.0	22.6	81.3	88.0	12.0	0	〃	100.0
3696.9	6578.1	3500.0	23.0	81.3	86.0	13.0	1.0	〃	100.0
3434.4	6176.9	3062.5	22.4	80.6	89.0	10.0	1.0	〃	92.9
3850.0	6924.5	3937.5	22.6	81.3	92.0	8.0	0	中上	104.1
3703.1	6554.2	3508.2	22.6	81.3	90.0	10.0	0	〃	100.2
3469.2	6239.6	3118.4	22.4	80.6	88.0	11.0	1.0	〃	93.8
3508.2	6242.3	3508.2	22.8	80.0	86.0	13.0	1.0	中	94.9
3371.8	5967.7	3898.0	22.6	80.6	84.0	15.0	1.0	中上	91.2
3449.7	6249.5	3898.0	22.6	80.6	92.0	8.0	0	中	93.3
3352.6	5871.4	3176.1	22.6	80.6	87.0	13.0	0	中上	90.7
3440.8	6025.9	3176.1	23.0	80.6	91.0	9.0	0	稍良	93.1
3387.8	6060.5	3529.0	22.2	81.3	86.0	14.0	0	中上	91.6

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第一五表（B）

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	ヘクトリットル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg
1	4	18	2	7.12	7.28	10.10	11.14	5.5	96.2	20.5	550.0	27.0	56.2
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	6.3	95.3	19.3	630.0	27.4	55.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	6.5	92.9	19.4	650.0	26.8	55.2
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	6.4	92.0	19.4	640.0	27.4	56.5
5	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	6.6	93.5	19.2	660.0	26.8	55.6
6	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.2	92.2	19.4	720.0	27.0	56.2
7	〃	20	2	〃	〃	10.14	11.18	5.7	94.5	19.7	461.7	27.0	56.2
8	〃	〃	3	〃	〃	10.13	11.17	7.0	94.1	20.3	567.0	27.0	55.9
9	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	7.4	96.1	19.3	599.4	26.8	56.5
10	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	7.1	95.5	19.0	575.1	27.0	56.5
11	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	6.9	94.0	19.6	558.9	26.8	55.9
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.8	95.3	19.1	631.8	27.0	55.9
13	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	7.9	92.6	19.4	639.9	27.2	55.9
14	〃	22	5	〃	〃	〃	〃	7.6	95.7	19.7	509.2	27.0	55.9
15	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	8.3	95.9	19.6	556.1	27.0	55.9
16	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	8.3	95.5	18.7	556.1	27.0	55.9
17	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	8.7	93.7	19.8	582.9	27.0	55.9
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	8.9	92.9	18.9	596.3	27.2	55.6
19	〃	24	6	〃	〃	10.15	11.19	9.4	95.0	19.7	526.4	26.8	55.6
20	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	9.9	95.0	19.5	554.4	26.8	54.9
21	〃	〃	9	〃	〃	10.14	11.18	10.0	94.2	19.3	560.0	26.8	55.9
22	〃	〃	10	〃	〃	〃	〃	10.3	92.8	19.6	576.8	27.0	55.6
23	〃	〃	11	〃	〃	10.13	11.17	11.0	93.4	19.2	616.0	27.0	55.6

備考 粒重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数3本

一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
4084.0	7266.9	4033.6	22.6	81.3	92.0	7.0	1.0	稍良	107.7
4235.3	7576.5	3529.4	23.0	80.6	91.0	9.0	0	〃	111.7
3932.8	7124.6	3529.4	22.6	81.3	96.0	4.0	0	〃	103.7
3857.1	6826.8	3529.4	23.0	81.3	92.0	8.0	0	〃	101.7
3958.0	7118.7	4033.6	22.6	80.6	95.0	5.0	0	〃	104.3
4310.9	7670.7	4537.8	22.6	80.6	92.0	7.0	1.0	〃	113.6
3581.1	6372.1	3769.6	22.6	80.6	93.0	7.0	0	中上	94.4
3793.2	6785.6	3298.4	22.4	81.3	93.0	7.0	0	〃	100.0
3981.3	7046.5	3500.0	22.2	80.6	92.0	8.0	0	〃	105.0
3784.4	6698.0	3937.5	22.8	80.6	94.0	5.0	1.0	〃	99.8
3718.8	6652.5	3062.5	22.6	81.3	92.0	8.0	0	稍良	98.0
3784.4	6769.9	3937.5	22.8	81.3	94.0	6.0	0	中	99.8
4025.0	7200.4	3937.5	22.8	81.3	95.0	5.0	0	〃	106.1
3588.7	6419.9	3377.6	22.6	81.3	92.0	7.0	1.0	稍良	94.6
3778.7	6759.7	3799.8	22.4	82.0	90.0	10.0	0	〃	99.6
3820.9	6835.3	3799.8	22.4	81.3	90.0	10.0	0	〃	100.7
3905.4	6986.3	3799.8	22.4	81.3	92.0	8.0	0	〃	103.0
3842.6	6910.1	3799.8	23.0	80.6	92.0	8.0	0	〃	101.3
3619.0	6509.0	3465.0	22.6	80.6	91.0	9.0	0	稍良	95.4
3638.3	6627.0	3465.0	22.4	81.3	93.0	7.0	0	中上	95.9
3580.5	6405.2	3465.0	22.4	81.3	95.0	5.0	0	〃	94.4
3599.8	6474.4	3465.0	22.4	81.3	93.0	7.0	0	中	94.9
3606.6	6486.8	3337.1	22.8	81.3	94.0	5.0	1.0	〃	95.1

植ヲ100トセリ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第 大 表 (C)

番號	播種量	株間	苗数	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時					
								穗数	草丈	穗長	坪当穗数	千粒重量	一ヘクトリツトル重量
	合	cm	本	月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg
1	4	18	2	7.12	7.30	10.14	11.18	5.5	94.3	20.0	550.0	27.0	55.6
2	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	5.4	95.9	19.9	540.0	27.2	54.9
3	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	5.7	92.9	19.0	570.0	27.0	55.2
4	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	6.0	90.1	19.2	600.0	27.2	55.2
5	〃	〃	6	〃	〃	10.13	11.17	6.4	90.5	19.6	640.0	27.0	55.9
6	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.0	90.9	18.1	700.0	27.2	56.5
7	〃	20	2	〃	〃	10.16	11.20	5.8	92.1	20.6	469.8	27.0	55.6
8	〃	〃	3	〃	〃	〃	〃	6.2	93.2	19.5	502.2	27.0	55.2
9	〃	〃	4	〃	〃	〃	〃	6.6	91.7	18.1	534.6	27.0	56.2
10	〃	〃	5	〃	〃	〃	〃	6.9	92.9	18.9	558.9	26.8	55.2
11	〃	〃	6	〃	〃	10.15	11.19	6.7	90.9	19.4	542.7	27.0	55.2
12	〃	〃	7	〃	〃	〃	〃	7.2	91.0	17.9	583.2	26.8	55.2
13	〃	〃	8	〃	〃	10.16	11.20	7.6	89.4	19.0	615.6	27.0	54.9
14	〃	22	5	〃	〃	10.19	11.21	7.8	93.3	19.0	522.6	27.2	55.6
15	〃	〃	6	〃	〃	〃	〃	8.4	95.1	19.1	562.8	27.2	55.9
16	〃	〃	7	〃	〃	10.17	11.20	7.9	93.0	19.3	529.3	27.0	54.9
17	〃	〃	8	〃	〃	10.15	11.18	8.4	92.6	19.3	562.8	27.0	55.2
18	〃	〃	9	〃	〃	〃	〃	9.0	94.0	19.3	603.0	27.0	55.6
19	〃	24	6	〃	〃	10.16	11.20	8.5	94.0	19.1	476.0	27.2	55.6
20	〃	〃	8	〃	〃	〃	〃	9.3	91.9	19.0	520.8	27.0	55.6
21	〃	〃	9	〃	〃	10.17	11.21	9.9	92.6	19.1	554.4	26.8	55.6
22	〃	〃	10	〃	〃	10.16	11.20	9.8	90.7	19.4	548.8	27.0	55.6
23	〃	〃	11	〃	〃	〃	〃	10.2	88.8	18.4	571.2	27.0	55.9

備考 籾重量指数ハ4合播株間20cm一株苗数3本

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

数			玄				米		数重量
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量	一ヘクタール当藁重量	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品標	指数
kg	L	kg	g	kg	%	%	%		%
3663.5	6589.0	3361.0	22.4	82.0	94.0	6.0	0	中上	107.2
3756.3	6842.1	3025.2	22.8	82.0	92.0	7.0	1.0	稍良	110.0
3705.9	6713.5	3529.4	22.6	82.0	91.0	9.0	0	〃	108.5
3705.9	6713.5	4033.6	23.0	82.0	91.0	8.0	1.0	〃	108.5
3705.9	6629.5	4033.6	22.8	82.0	93.0	7.0	0	〃	108.5
3756.3	6648.3	3529.4	22.4	82.0	95.0	5.0	0	良	110.0
3204.2	5762.9	3298.4	22.8	82.6	91.0	9.0	0	稍良	94.8
3416.2	6188.8	3298.4	22.6	82.0	95.0	4.0	1.0	〃	100.0
3463.3	6162.5	3298.4	22.8	82.0	92.0	7.0	1.0	〃	101.4
3486.9	6316.8	3298.4	22.4	82.0	91.0	7.0	2.0	良	102.1
3463.3	6274.1	3298.4	22.4	82.0	96.0	4.0	0	稍良	101.4
3298.4	5975.4	3298.4	22.2	82.0	96.0	3.0	1.0	〃	96.6
3133.5	5707.6	3298.4	22.4	82.0	96.0	4.0	0	〃	91.7
3293.2	5923.0	3377.6	22.6	82.0	94.0	6.0	0	〃	96.4
3440.9	6155.5	3377.6	22.8	82.0	92.0	8.0	0	〃	100.7
3356.5	6113.8	3377.6	22.8	82.0	92.0	7.0	1.0	〃	98.3
3419.8	6195.3	3377.6	22.8	82.0	93.0	7.0	0	中上	100.1
3335.4	5998.9	3377.6	22.4	82.0	96.0	4.0	0	稍良	97.6
3176.3	5712.7	3080.0	22.4	82.0	93.0	7.0	0	〃	93.0
3311.0	5955.0	3080.0	22.8	82.0	91.0	9.0	0	〃	96.9
3137.8	5643.4	3080.0	22.2	81.3	95.0	5.0	0	〃	91.9
3137.8	5643.4	3080.0	22.6	82.0	94.0	5.0	1.0	〃	91.9
3060.8	5475.4	3080.0	22.4	82.0	95.0	5.0	0	〃	89.6

植ヲ１００トセリ

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

中　間　作

標準肥料區

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付株苗数	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量	一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量
月日	合	日	cm	本	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg	kg	l
5.20	4	20	21	2	10.8	11.10	11.5	102.3	21.8	839.5	26.6	55.2	4908.0	8891.3
			23	4	10.8	〃	13.0	101.7	22.0	793.0	26.6	56.5	4292.7	7597.7
6.10	4	15	21	2	10.8	〃	13.8	107.7	22.5	1007.4	26.4	55.2	4908.0	8891.3
				4	10.8	〃	15.4	103.8	20.6	1124.2	26.4	54.3	4968.0	9149.2
			23	4	10.8	〃	16.5	103.1	22.4	1006.5	27.0	55.9	5008.4	8959.6
	6	15	21	4	10.8	〃	16.0	104.5	21.9	1168.0	26.4	54.9	4995.6	9099.5
			23	4	10.8	〃	16.6	106.9	21.0	1012.6	27.0	55.6	5150.4	9263.3
6.20	4	12	21	4	10.7	〃	12.6	103.5	20.4	919.8	27.2	54.9	5152.0	9384.3
			23	4	〃	〃	14.6	107.5	21.3	890.6	26.0	54.6	5219.3	9559.2
		15	21	2	10.5	〃	12.8	106.2	20.8	934.4	26.2	53.8	4618.0	8583.6
				4	〃	〃	12.6	107.7	20.9	919.8	25.8	53.8	5336.0	9918.2
			23	2	10.4	〃	15.1	108.1	20.8	921.1	25.8	53.2	5437.6	10221.0
				4	〃	〃	13.8	109.7	20.4	841.8	25.4	52.6	4614.0	8771.9
		18	21	2	10.7	11.11	11.4	106.7	21.2	832.2	26.4	54.1	4151.0	7672.9
			23	2	〃	〃	13.4	107.8	20.7	817.4	26.0	54.3	5166.0	9513.8
	6	12	21	4	10.8	11.10	12.3	103.4	21.0	897.9	26.8	54.9	5174.0	9424.4
			23	4	〃	〃	14.9	107.4	22.4	908.9	26.4	54.1	5034.0	5305.0
		15	21	2	10.4	〃	11.3	105.2	21.0	824.9	26.6	54.1	5152.0	9523.1
				4	〃	〃	11.9	105.4	20.4	868.7	26.4	54.3	5220.0	10165.7
			23	4	〃	〃	13.4	109.6	20.2	817.4	26.4	54.3	4614.0	8497.2
		18	21	4	10.7	11.11	12.3	105.4	20.9	897.9	26.6	53.1	5501.9	10361.4
			23	4	〃	〃	13.9	106.7	21.2	847.9	26.2	55.6	4723.2	8494.9

一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	収量指数	出穗前葉枯病発生多少	出穗前亀甲虫発生多少	収穫前螟虫発生多少	倒伏多少	立毛良否
kg	g	kg	%	%	%		%					
3681.0	22.4	80.6	91.0	7.0	2.0	稍良	96.1	大	少	無	極少	稍良
3295.0	22.4	80.6	91.0	7.0	2.0	〃	84.1	〃	〃	〃	〃	〃
4662.6	22.4	80.0	90.0	10.0	0	中上	96.1	中	〃	〃	中	良
5796.0	22.2	80.6	87.0	13.0	0	中	97.3	〃	〃	〃	〃	〃
4349.4	23.0	79.4	93.0	7.0	0	稍良	98.1	〃	〃	〃	〃	〃
5934.0	22.0	80.6	88.0	11.0	1.0	中	97.8	〃	〃	〃	〃	〃
4566.0	22.8	79.4	86.0	12.0	2.0	〃	100.9	〃	〃	〃	〃	〃
4857.6	22.8	79.4	86.0	13.0	1.0	〃	100.9	少	〃	〃	〃	〃
4200.9	22.0	80.0	91.0	9.0	0	中上	102.2	〃	〃	〃	〃	〃
4417.6	22.0	79.4	88.0	12.0	0	〃	90.5	極少	〃	〃	〃	〃
4140.0	21.2	81.3	87.0	12.0	1.0	中下	104.5	〃	〃	〃	〃	〃
4660.8	21.6	80.0	87.0	11.0	2.0	稍良	106.5	〃	〃	〃	〃	〃
4614.0	21.2	80.6	88.0	10.0	2.0	中下	96.4	〃	〃	〃	〃	〃
4416.0	22.4	79.4	89.0	11.0	0	〃	81.3	〃	〃	〃	〃	〃
4797.0	22.0	79.4	87.0	12.0	1.0	〃	101.2	〃	〃	〃	〃	〃
4776.0	22.6	80.0	93.0	7.0	0	稍良	101.3	中	〃	少	〃	〃
5201.8	22.0	80.0	86.0	12.0	2.0	中上	98.6	〃	〃	〃	〃	〃
4600.0	22.6	80.0	89.0	9.0	2.0	中下	106.9	極少	〃	〃	〃	〃
4048.0	22.2	80.6	90.0	10.0	0	中上	102.2	〃	〃	〃	〃	〃
5844.4	22.2	79.4	84.0	14.0	2.0	中下	90.4	〃	〃	〃	〃	〃
4216.8	22.4	79.4	87.0	12.0	1.0	〃	107.8	〃	〃	無	〃	〃
4243.5	22.0	79.4	89.0	9.0	2.0	稍良	92.5	〃	〃	〃	〃	〃

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付株苗数	出穂期	成熟期	収穫当時				数			
							穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量	一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量
月日	合	日	cm	本	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg	kg	ℓ
6.30	4	12	21	2	10.9	11.13	12.0	111.5	21.4	876.0	26.6	52.9	5085.8	9613.9
				4	10.8	11.12	12.2	109.8	20.5	890.6	26.4	54.1	5394.8	9972.1
			23	4	10.9	11.13	15.3	111.2	21.3	927.2	26.8	54.1	5194.6	9601.8
		15	21	2	〃	〃	10.9	108.1	21.3	795.7	26.2	53.5	4782.7	8939.6
				4	10.8	11.12	11.2	105.3	20.7	817.6	26.6	55.2	5105.5	9249.1
			23	2	〃	〃	12.2	105.3	21.3	744.2	26.6	54.3	4706.3	8667.2
				4	〃	〃	12.7	105.7	20.0	774.7	26.6	54.3	4782.2	8807.1
	6	12	21	2	10.10	11.14	16.8	112.1	22.1	1226.4	26.6	55.6	4357.9	7838.0
				4	10.9	11.13	12.2	109.7	19.3	890.6	26.6	54.3	5254.4	9676.5
			23	4	〃	〃	14.1	106.4	21.6	860.1	26.6	54.6	5343.1	9785.9
		15	21	2	〃	〃	10.6	110.1	20.5	773.8	26.4	54.6	4493.9	8230.5
				4	10.7	11.11	11.6	104.6	20.3	846.8	26.4	55.6	4876.1	8770.0
			23	4	〃	〃	13.0	106.4	20.2	793.0	26.0	54.9	4929.3	8978.7
7.10	4	12	21	2	10.8	11.12	10.6	106.9	21.0	773.8	26.4	54.3	5228.4	9628.8
				4	〃	〃	11.7	105.1	20.0	854.1	26.4	55.6	5465.1	9829.4
			23	4	10.9	11.13	13.5	110.2	21.2	823.5	26.4	54.3	5216.9	9607.5
		15	21	2	〃	〃	10.3	110.9	20.9	751.9	26.4	54.1	4939.7	9130.6
				4	10.8	11.12	11.7	107.4	20.8	854.1	26.4	54.9	5271.0	9601.1
			23	2	10.9	11.13	12.0	108.5	20.9	732.0	25.8	54.3	4660.1	8582.2
				4	〃	〃	12.9	108.0	20.9	786.9	26.4	54.3	5005.9	9218.9
	6	12	21	2	〃	〃	11.4	109.0	21.3	832.2	26.4	54.1	5359.2	9906.1
				4	〃	〃	12.2	108.9	18.9	890.6	27.0	55.2	5196.8	9414.5
			23	4	10.10	11.14	14.0	107.7	20.0	854.0	26.6	54.1	5107.5	9440.8
		15	21	2	10.9	11.13	10.4	109.5	20.0	759.2	26.2	53.8	4968.0	9234.2
			23	4	10.8	11.12	13.0	106.7	20.5	793.0	26.4	54.9	4913.3	8949.5

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	米 良米	米 青米	米 死米	米 品質	籾重量指数	出穂前葉稲熱病発生多少	出穂前鉄甲虫発生多少	収穫前螟虫発生多少	倒伏多少	毛立良否
kg	g	kg	%	%	%		%					
4563.2	22.0	79.4	88.0	10.0	2.0	中	99.6	極少	少	無	少	良
5593.6	22.4	78.7	90.0	10.0	0	稍良	105.7	〃	〃	〃	〃	〃
4442.8	22.4	79.4	89.0	11.0	0	中上	101.7	〃	〃	〃	〃	〃
4247.5	22.0	80.0	87.0	12.0	1.0	〃	93.7	〃	〃	〃	〃	〃
4757.2	22.0	79.4	89.0	9.0	2.0	稍良	100.0	〃	〃	〃	〃	〃
3998.8	22.0	79.4	89.0	9.0	2.0	〃	92.2	〃	〃	〃	〃	〃
4575.6	22.4	78.7	87.0	13.0	0	中上	93.7	〃	〃	〃	〃	〃
3567.9	22.4	78.7	88.0	12.0	0	稍良	85.4	〃	〃	〃	〃	稍良
5178.2	22.4	80.0	86.0	14.0	0	中	102.9	〃	〃	〃	〃	良
4870.8	22.2	79.4	92.0	7.0	1.0	中上	104.7	〃	〃	〃	〃	〃
4077.6	22.0	80.0	91.0	9.0	0	〃	88.0	〃	〃	〃	〃	〃
4927.1	22.4	79.4	91.0	9.0	0	稍良	95.5	〃	〃	〃	〃	〃
4767.8	22.0	79.4	90.0	9.0	1.0	〃	96.6	〃	〃	〃	〃	〃
5260.0	22.0	80.0	89.0	10.0	1.0	中上	102.4	無	〃	〃	〃	〃
5260.0	22.0	80.0	89.0	11.0	0	稍良	107.0	〃	〃	〃	〃	〃
4922.4	22.2	79.4	93.0	7.0	0	中上	102.8	〃	〃	〃	〃	〃
4919.6	22.2	80.0	89.0	10.0	1.0	〃	100.0	〃	〃	〃	〃	〃
5020.0	22.0	80.0	89.0	10.0	1.0	稍良	100.0	〃	〃	〃	〃	〃
4152.6	21.4	80.0	86.0	13.0	1.0	〃	91.3	〃	〃	〃	〃	〃
4834.5	22.2	80.0	90.0	8.0	2.0	〃	98.1	〃	〃	〃	〃	〃
7795.2	22.2	80.0	92.0	7.0	1.0	中上	105.0	〃	〃	〃	〃	〃
7795.2	22.4	80.0	89.0	11.0	0	稍良	101.8	〃	〃	〃	〃	〃
4855.0	22.4	80.0	88.0	11.0	1.0	中上	100.0	〃	〃	〃	〃	〃
4320.0	22.0	79.4	90.0	9.0	1.0	〃	97.3	〃	〃	〃	〃	〃
4660.8	22.4	79.4	89.0	9.0	2.0	〃	96.2	〃	〃	〃	〃	〃

一株間21cm一株本数2本及々木ノ籾平均重量ヲ

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付株當本数	出穂期	成熟期	収穫当時				籾			
							穂数	草丈	穂長	坪当穂数	千粒重量	一ヘクトリットル重量	一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量
月日	合	日	cm	本	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg	kg	L
4.10	4	20	21	2	10.8	11.12	6.3	139.0	22.6	459.9	27.0	48.8	2316.0	4745.9
		30	21	2	〃	〃	6.3	142.9	23.1	459.9	27.0	48.5	3010.0	6206.2
		40	21	2	〃	〃	5.6	144.1	24.9	408.8	27.0	49.5	2758.8	5573.4
	6	20	23	4	〃	〃	7.6	142.9	24.1	463.6	27.4	49.0	2680.2	5469.7
		30	23	4	10.10	〃	7.0	143.1	23.6	427.0	27.0	50.0	2802.4	5604.8
4.30	4	20	21	2	〃	11.14	5.3	148.4	25.0	386.9	26.4	48.5	2848.7	5873.5
			23	2	10.11	〃	6.0	142.7	24.1	366.0	26.2	49.0	2923.9	5967.2
				4	〃	〃	6.5	136.4	22.9	396.5	25.6	48.5	2829.6	5834.2
		30	21	2	10.7	11.11	6.4	139.7	22.6	467.2	27.4	48.3	1935.7	4007.6
				4	〃	〃	6.9	137.3	22.1	503.7	27.6	46.7	1722.2	3687.9
			23	2	〃	〃	8.3	138.3	21.7	506.3	27.0	49.8	1790.8	3595.9
				4	10.8	11.12	8.0	140.2	22.4	488.0	27.6	47.4	2130.1	4493.9
		40	23	4	10.10	11.14	6.7	149.7	23.6	408.7	27.0	46.7	2410.8	5162.3
	6	20	21	2	10.11	〃	5.5	141.6	23.6	401.5	26.8	49.5	3806.1	7689.0
			23	4	〃	〃	6.6	143.2	23.8	402.6	25.8	47.2	2496.9	5290.0
		30	21	2	10.8	11.12	7.5	140.4	21.7	547.5	26.4	50.0	2449.5	4899.0
				4	〃	〃	7.8	136.1	22.8	569.4	26.6	49.3	2056.2	4170.8
			23	2	〃	〃	8.2	137.5	22.6	500.2	27.2	49.5	2057.3	4156.2
				4	〃	〃	8.0	140.3	23.6	488.0	27.0	48.1	2459.5	5113.3

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数	出穗前葉枯病発生多少	出穗前鉄甲虫発生多少	収穫前螟虫発生多少	倒伏多少	立毛多少
kg	g	kg	%	%	%		%					
5867.2	22.8	79.4	96.0	1.0	3.0	良	69.3	極多	極多	極少	全	良
5038.8	22.6	79.4	96.0	4.0	0	〃	90.0	多	多	〃	〃	〃
5272.2	22.6	78.7	95.0	2.0	3.0	〃	82.5	中	中	〃	〃	〃
5596.9	23.2	77.5	91.0	5.0	4.0	〃	80.2	極多	極多	〃	〃	〃
5485.5	22.4	79.4	98.0	2.0	0	〃	83.8	多	多	〃	〃	〃
5179.4	22.4	78.7	92.0	7.0	1.0	〃	85.2	中	中	〃	〃	〃
4296.8	21.6	78.7	84.0	12.0	4.0	〃	87.5	〃	〃	〃	〃	〃
3982.4	21.0	78.1	80.0	19.0	1.0	〃	84.6	〃	〃	〃	〃	〃
6329.6	22.8	78.1	95.0	4.0	1.0	〃	57.9	少	少	〃	〃	〃
6329.6	23.0	78.7	93.0	2.0	5.0	〃	51.5	〃	〃	〃	〃	〃
6424.9	23.0	79.4	94.0	3.0	3.0	〃	53.6	〃	〃	〃	〃	〃
6148.8	23.4	78.1	93.0	2.0	5.0	〃	63.7	〃	〃	〃	〃	〃
6113.6	23.0	78.7	80.0	8.0	12.0	〃	72.1	極少	極少	〃	〃	〃
4684.4	22.0	78.7	89.0	11.0	0	〃	113.8	中	中	〃	〃	〃
4059.0	21.6	78.1	83.0	15.0	2.0	〃	74.7	〃	〃	〃	〃	〃
6624.0	22.2	80.0	91.0	3.0	6.0	〃	73.3	少	少	〃	〃	〃
6900.0	22.4	79.4	92.0	5.0	3.0	〃	61.5	〃	〃	〃	〃	〃
6288.2	22.6	80.0	97.0	2.0	1.0	稍良	61.5	〃	〃	〃	〃	〃
6148.8	22.8	78.1	85.0	13.0	2.0	良	73.4	〃	〃	〃	〃	〃

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付一株苗数	出穂期	成熟期	収穫当時 穂数	収穫当時 草丈	収穫当時 穂長	収穫当時 坪当穂数	籾 千粒重量	籾 一ヘクトリットル重量	籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量
月日	合	日	cm	本	月日	月日	本	cm	cm	本	g	Kg	Kg	L
5.30	4	15	21	2	10.14	11.17	7.2	142.4	26.4	525.6	26.0	48.5	4282.2	8829.3
			23	4	〃	〃	10.2	149.5	25.0	622.2	25.8	47.4	4520.3	9536.4
	6	15	21	2	〃	〃	11.0	147.8	25.4	803.0	25.6	49.5	4858.7	9815.6
			23	4	〃	〃	11.4	139.6	23.9	695.4	25.8	49.8	4644.0	9325.3
6.9	4	20	21	2	10.13	〃	6.5	142.7	24.4	474.5	25.6	45.7	3155.6	6905.0
				4	〃	〃	5.6	138.5	24.3	408.8	26.8	46.5	2892.5	6220.4
			23	2	10.14	〃	7.8	138.9	24.1	475.8	26.0	45.9	3305.7	7201.9
				4	〃	〃	7.2	140.8	24.2	439.2	25.6	46.3	3222.1	6959.2
	6	20	21	2	10.15	〃	6.9	136.0	23.5	503.7	25.6	49.0	2811.2	5737.1
				4	〃	〃	7.8	1360.0	23.0	569.4	24.4	46.1	3042.1	6598.9
			23	2	10.16	〃	9.4	134.0	23.1	573.4	24.2	45.7	3070.7	6719.3
				4	〃	〃	9.4	135.4	23.3	573.4	24.4	46.5	3009.4	647.1.8
	4	15	21	2	〃	〃	8.3	131.4	22.5	605.9	24.6	46.7	3333.3	7137.6
				4	〃	〃	10.6	133.4	22.8	773.8	24.4	45.9	3882.4	8458.4
			23	2	〃	〃	12.8	133.6	23.1	780.8	25.8	47.6	4100.0	8613.4
				4	〃	〃	11.6	135.4	22.8	707.6	25.2	48.8	4362.8	8940.2
		20	21	2	10.17	11.18	11.6	139.2	23.2	846.8	25.0	47.4	3477.6	7336.7
				4	〃	〃	11.3	138.0	23.4	824.9	24.4	46.7	3263.8	6988.9
			23	2	〃	〃	14.3	136.2	22.2	872.3	24.4	49.0	3714.3	7580.1
				4	〃	〃	13.0	133.5	22.4	793.0	24.8	48.8	3126.3	6406.3
		25	21	2	〃	〃	9.5	134.6	21.9	693.5	24.8	47.4	3343.3	7053.4
			23	4	〃	〃	10.6	131.1	22.7	646.6	24.4	46.5	2999.1	6449.7

一ヘクタール当藁重量	玄米 千粒重量	玄米 一ヘクトリットル重量	玄米 良米	玄米 青米	玄米 死米	玄米 品質	籾重量指数	出穂前葉イモチ病発生ノ多少	出穂前鉄甲亀発生ノ多少	収穫前螟虫発生ノ多少	倒伏多少	立毛良否
Kg	g	Kg	%	%	%		%					
6380.4	21.6	79.4	75.0	22.0	3.0	中	128.1	極少	極少	極少	全	良
6303.8	21.6	78.1	84.0	13.0	3.0	中上	135.2	〃	〃	〃	〃	〃
6625.5	21.4	79.4	89.0	10.0	1.0	〃	145.3	〃	〃	〃	〃	〃
6766.1	21.6	79.4	90.0	9.0	1.0	〃	138.9	〃	〃	〃	〃	〃
6348.0	21.2	76.9	85.0	14.0	1.0	中	94.4	無	無	〃	〃	〃
5004.8	22.2	78.7	91.0	8.0	1.0	〃	86.5	〃	〃	〃	〃	〃
4866.2	21.8	78.1	80.0	15.0	5.0	〃	98.9	〃	〃	〃	〃	〃
4614.0	21.4	79.4	88.0	12.0	0	中上	96.4	〃	〃	〃	〃	〃
4919.6	21.2	80.0	78.0	17.0	5.0	〃	84.1	〃	〃	〃	〃	〃
5120.4	20.0	78.7	61.0	30.0	9.0	中	91.0	〃	〃	〃	〃	〃
4698.4	20.0	79.4	80.0	18.0	2.0	〃	91.8	〃	〃	〃	〃	〃
5055.8	20.0	76.9	80.0	19.0	1.0	〃	90.0	〃	〃	〃	〃	〃
4919.6	20.0	79.4	81.0	18.0	1.0	中	99.7	〃	〃	〃	〃	〃
5980.0	20.2	78.7	64.0	31.0	5.0	中下	116.1	〃	〃	〃	〃	〃
6560.0	21.0	78.7	86.0	14.0	0	〃	122.6	〃	〃	〃	〃	〃
6712.0	21.0	78.2	81.0	19.0	0	〃	130.5	〃	〃	〃	〃	〃
6624.0	20.4	80.0	86.0	8.0	6.0	稍良	104.0	〃	〃	無	極少	〃
6625.8	20.2	79.4	93.0	6.0	1.0	〃	97.6	〃	〃	〃	〃	〃
6921.0	20.2	80.0	86.0	10.0	4.0	〃	111.1	〃	〃	〃	〃	〃
6970.0	20.2	80.0	83.0	9.0	8.0	良	93.5	〃	〃	〃	〃	〃
6224.8	20.4	80.0	92.0	7.0	1.0	稍良	100.0	〃	〃	極少	〃	〃
5075.4	20.0	78.7	86.0	12.0	2.0	中上	89.7	〃	〃	〃	〃	〃

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

播種期	播種量	苗代日数	植付株間	植付一株苗数	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	收穫当時 穗長	收穫当時 坪当穗数	籾 千粒重量	籾 一ヘクトリットル重量	籾 一ヘクタール当重量	籾 一ヘクタール当容量
月日	合	日	cm	本	月日	月日	本	cm	cm	本	g	kg	kg	L
6.19	6	15	21	2	10.20	11.20	11.0	136.7	23.0	803.0	25.4	47.4	2208.5	4659.3
				4	〃	〃	14.9	133.5	23.1	1087.7	25.6	46.7	3551.2	7604.3
			23	2	〃	〃	14.2	137.3	23.6	866.2	25.2	49.5	2965.5	5990.9
				4	10.19	11.19	15.5	134.6	23.0	945.5	25.2	49.5	3783.5	7643.4
		20	21	2	10.14	11.18	11.8	135.1	22.5	861.4	25.4	48.1	3511.5	7300.4
				4	10.16	11.17	11.6	136.4	23.6	846.8	24.8	47.8	3931.1	8224.1
			23	2	10.17	11.18	15.6	135.5	22.2	951.6	26.2	47.8	4890.0	10230.2
				4	〃	〃	13.1	136.6	22.9	799.1	25.8	45.9	4359.3	9497.4
	8	20	23	4	〃	〃	16.9	136.0	22.6	1030.9	25.6	50.0	4951.6	9903.1
				6	〃	〃	17.8	132.0	21.9	1085.8	26.0	46.7	4982.0	10668.0
				8	〃	〃	15.9	132.0	22.1	969.9	25.8	50.8	4078.6	8028.6
6.29	4	15	21	2	10.20	11.20	9.1	128.7	21.1	664.3	25.2	46.7	3122.3	6685.8
			23	4	10.19	11.19	11.2	132.0	20.2	683.2	24.4	48.3	3260.1	6749.7
		20	21	2	〃	〃	9.3	133.3	22.1	678.9	24.8	46.9	4034.8	8603.0
			23	4	〃	〃	11.6	133.6	22.1	707.6	24.4	49.0	3075.0	6275.5
	6	15	23	4	10.20	11.20	10.9	128.0	20.8	664.9	24.6	47.6	2837.4	5960.9
	8	15	23	6	〃	〃	11.8	129.2	21.4	719.8	24.8	47.6	2530.0	5315.1

備考 籾重量指数ハ6月19日播4合播25日苗株間

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

一ヘクタール当藁重量	玄	米					籾重量指数	出穂前葉イモチ病発生多少	出穂前鉄甲亀発生多少	収穫前螟虫発生多少	倒伏多少	立毛良否
	千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質						
Kg	g	Kg	%	%	%		%					
6310.0	20.8	78.7	85.0	9.0	6.0	稍良	66.1	無	無	中	不倒伏	否
6256.0	21.0	79.4	95.0	4.0	1.0	良	106.2	〃	〃	〃	〃	〃
6326.4	20.6	80.6	94.0	5.0	1.0	稍良	88.6	〃	〃	〃	〃	〃
6921.0	20.6	80.0	96.0	3.0	1.0	良	113.2	〃	〃	〃	〃	〃
6625.5	20.8	80.0	93.0	4.0	3.0	〃	105.0	〃	〃	無	極少	良
6625.5	20.2	80.0	83.0	13.0	4.0	中上	117.6	〃	〃	〃	〃	〃
6766.0	21.8	80.0	95.0	4.0	1.0	稍良	146.3	〃	〃	〃	〃	〃
6919.5	21.4	79.4	83.0	13.0	4.0	〃	130.4	〃	〃	〃	〃	〃
6766.1	21.0	80.6	88.0	7.0	5.0	良	148.1	〃	〃	極少	〃	〃
6853.6	21.4	79.4	95.0	4.0	1.0	〃	149.0	〃	〃	〃	〃	〃
6643.8	21.4	80.6	92.0	7.0	1.0	稍良	122.0	〃	〃	〃	〃	〃
5097.6	20.6	79.4	89.0	10.0	1.0	中上	93.4	〃	〃	〃	〃	〃
5252.1	20.2	80.0	82.0	18.0	0	中	97.5	〃	〃	〃	〃	〃
5396.5	20.6	78.7	77.0	21.0	2.0	中下	120.7	〃	〃	〃	〃	〃
5330.0	20.2	79.4	65.0	32.0	3.0	〃	92.0	〃	〃	〃	〃	〃
5252.1	20.2	79.4	76.0	20.0	4.0	中	84.9	〃	〃	〃	〃	〃
6152.0	20.4	79.4	84.0	15.0	1.0	〃	75.7	〃	〃	〃	〃	〃

21cm 一株本数2本植籾重量ヲ100トス

第二節　地力増進試験

目的　地力ヲ増進セシムルニ農家ノ容易ニ実行シ得且経済的ナルト共ニ効果最モ顕著ナル方法ヲ考究セントス

方法　1.供試品種

第一期作台北六八号（現在台中六五号）

第二期作鵞卵朮

2.試験面積一區五坪

3.試験區別及施肥量（反当）

區番	試験別	施肥量（單位貫）				
		客土	堆肥	緑肥	大豆粕	過燐酸石灰
1	標準區	-	200	-	20	7
2	堆肥區	-	500	-	15	7
3	緑肥區	-	-	450	15	7
4	客土區	3.000	-	-	15	7
5	標準區深耕	-	200	-	20	7
6	堆肥區深耕	-	500	-	15	7
7	緑肥區深耕	-	-	450	15	7
8	客土區深耕	3.000	-	-	15	7

備考　イ.深耕區ハ耕度六寸　普通區ハ四寸トス

ロ　緑肥ハ青皮豆生茎重量トス

4　地力調査

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

如上ノ操作ヲA組ハ昭和八年迄B組ハ昭和五年迄夫々継続シ以後何レモ無肥料栽培ヲナシ地力調査ヲナセリ

地力増進操作

A組　昭和元年乃至昭和八年第一期作

B組　昭和元年乃至昭和五年第一期作

無肥料栽培

A組　昭和八年第二期作乃至昭和十一年第二期作

B組　昭和五年第二期作乃至昭和十一年第二期作

無肥料栽培回数

A組　昭和十一年第一期作迄6回二期作迄7回

B組　昭和十一年第一期作迄12回二期作迄13回

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

成績（A組）　　　　　　第一

區番	區名	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	五坪收量 籾重量	五坪收量 藁重量
		月 日	月 日	月 日	月 日	本	cm	〆	〆
1	標準區	1.19	3.19	6.17	7.9	11.9	85.3	1.105	1.032
2	堆肥區	〃	〃	〃	〃	11.3	86.5	1.200	1.280
3	綠肥區	〃	〃	〃	〃	10.2	84.6	907	985
4	客土區	〃	〃	〃	〃	10.3	87.7	1.133	1.140
5	標準區深耕	〃	〃	〃	〃	10.6	81.2	813	940
6	堆肥區深耕	〃	〃	〃	〃	10.1	84.9	1.053	1.055
7	綠肥區深耕	〃	〃	〃	〃	10.4	81.8	907	883
8	客土區深耕	〃	〃	〃	〃	9.6	81.8	827	883

第二

區番	區名	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫当時 穗数	收穫当時 草丈	五坪收量 籾重量	五坪收量 藁重量
		月 日	月 日	月 日	月 日	本	cm	〆	〆
1	標準區	7.13	7.31	10.10	11.27	7.9	104.9	859	1.586
2	堆肥區	〃	〃	〃	〃	9.4	108.1	1.011	1.813
3	綠肥區	〃	〃	〃	〃	8.4	100.7	894	1.532
4	客土區	〃	〃	〃	〃	7.3	106.2	899	1.760
5	標準區深耕	〃	〃	〃	〃	8.3	104.1	882	1.520
6	堆肥區深耕	〃	〃	〃	〃	8.0	106.2	920	1.653
7	綠肥區深耕	〃	〃	〃	〃	8.0	104.2	854	1.559
8	客土區深耕	〃	〃	〃	〃	7.7	105.1	836	1.506

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

期　作

籾一升重量	反当籾収量		籾収量比率		反当藁収量	藁収量比率	藁100ニ對スル籾比率	米質
	重量	容量	重量	容量				
匁	メ	石	%	%	メ	%	%	
286.3	66.360	2.316	100	100	61.920	100	107	中
283.0	72.000	2.544	109	110	76.800	124	94	〃
271.8	54.420	2.000	82	86	59.160	96	92	〃
286.3	67.980	2.374	103	103	68.400	110	99	〃
279.7	48.780	1.744	74	75	56.400	91	86	〃
286.3	63.180	2.207	95	95	63.300	102	100	〃
271.8	54.420	2.002	82	86	52.980	86	103	〃
279.7	49.620	2.132	75	92	52.980	86	94	〃

期　作

籾一升重量	反当籾収量		籾収量比率		反当藁収量	藁収量比率	藁100ニ對スル籾比率	米質
	重量	容量	重量	容量				
匁	メ	石	%	%	メ	%	%	
244.2	51.540	2.111	100	100	95.160	100	54	中
246.7	60.660	2.459	118	116	108.780	114	56	〃
248.0	53.640	2.163	104	102	91.920	97	58	〃
244.2	53.940	2.208	105	104	105.600	110	51	〃
245.4	52.920	2.156	103	102	91.200	96	58	〃
250.5	55.200	2.204	107	104	99.180	104	56	〃
249.3	51.240	2.055	99	97	93.540	98	55	〃
251.9	50.160	1.991	97	94	90.360	95	56	〃

第一 成績（B組）

區番	區名	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	收穫当時 草丈	五坪收量 籾重量	五坪收量 藁重量
		月 日	月 日	月 日	月 日	本	cm	メ	メ
1	標準區	1.19	3.19	6.17	7.9	10.1	83.6	1.066	952
2	堆肥區	〃	〃	〃	〃	9.3	83.0	893	917
3	緑肥區	〃	〃	〃	〃	9.5	80.2	720	860
4	客土區	〃	〃	〃	〃	10.6	83.1	1.066	1.085
5	標準區深耕	〃	〃	〃	〃	8.8	81.7	786	786
6	堆肥區深耕	〃	〃	〃	〃	9.9	82.2	907	837
7	緑肥區深耕	〃	〃	〃	〃	10.3	83.1	960	860
8	客土區深耕	〃	〃	〃	〃	8.6	81.8	786	803

第二

區番	區名	播種期	挿秧期	出穂期	成熟期	收穫当時 穂数	收穫当時 草丈	五坪收量 籾重量	五坪收量 藁重量
		月 日	月 日	月.日	月 日	本	cm	メ	メ
1	標準區	7.13	7.31	10.10	11.27	7.6	102.9	864	1.466
2	堆肥區	〃	〃	〃	〃	8.4	101.7	922	1.479
3	緑肥區	〃	〃	〃	〃	6.5	1043	866	1.413
4	客土區	〃	〃	〃	〃	9.0	1044	852	1.627
5	標準區深耕	〃	〃	〃	〃	8.0	99.8	825	1.386
6	堆肥區深耕	〃	〃	〃	〃	8.5	97.8	853	1.466
7	緑肥區深耕	〃	〃	〃	〃	7.1	1035	864	1.453
8	客土區深耕	〃	〃	〃	〃	7.6	99.7	755	1.307

農業部農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
1895

期　作

籾一升重量	反当籾収量 重量	反当籾収量 容量	籾収量比率 重量	籾収量比率 容量	反当藁収量	藁収量比率	藁100ニ對スル籾比率	米質
匁	〆	石	%	%	〆	%	%	
286.3	63.960	2.234	100	100	57.120	100	112	中
283.0	53.580	1.893	84	84	55.020	96	97	〃
271.8	43.200	1.589	68	71	51.600	90	84	〃
286.3	63.960	2.234	100	100	65.340	114	98	〃
279.7	47.160	1.686	74	75	47.160	83	100	〃
286.3	54.420	1.900	85	85	50.220	88	108	〃
271.8	57.600	2.119	90	95	51.600	90	112	〃
279.7	47.160	1.686	74	75	48.180	84	98	〃

期　作

籾一升重量	反当籾収量 重量	反当籾収量 容量	籾収量比率 重量	籾収量比率 容量	反当藁収量	藁収量比率	藁100ニ對スル籾比率	米質
匁	〆	石	%	%	〆	%	%	
250.5	51.840	2.069	100	100	87.960	100	59	中
241.7	55.320	2.289	107	110	88.740	101	62	〃
246.7	51.960	2.106	100	102	84.780	96	61	〃
246.7	51.120	2.072	99	100	97.620	110	52	〃
246.7	49.500	2.006	95	97	83.160	95	60	〃
248.0	51.180	2.064	99	100	87.960	100	58	〃
246.7	51.840	2.101	100	102	87.180	99	59	〃
244.2	45.300	1.855	87	90	78.420	89	58	〃

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

第三節　水稻作用水量試驗

目的　水深ト稻ノ生育状態ヲ試査セントス

方法　1. 供試品種　台中六五號

2. 試驗區

a 飽水區

b 水深4cm區

c 水深8cm區

d 水深12cm區.

3 試驗面積　各一區面積2米平方

4 播種期及挿秧期

	第一期作	第二期作
播種期	1月19日	7月13日
挿秧期	3月20日	8月1日

5 株間及植付本数

20cm×20cm　3本植

6. 肥培管理

当場一般方法ニ依ル

調査　1. 生育調査

生育中盤時ニ草丈分蘗ノ調査ヲ施行ス

2 收量調査

当場一般方法ニ依ル

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

續

第　一

番號	區別	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫當時 穗数	收穫當時 草丈	收穫當時 穗長	千粒重量	一ヘクタール重量
		月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	g	kg
1	泡水區	1.19	3.20	6.16	7.16	12.3	95.1	20.2	28.2	58.5
2	水深四糎區	〃	〃	6.14	7.14	13.1	96.9	18.3	27.6	56.8
3	水深八糎區	〃	〃	6.15	7.15	13.2	102.5	19.5	27.6	55.9
4	水深拾貳糎區	〃	〃	6.15	7.15	12.8	98.9	18.8	27.2	56.8

備考 籾重量指数ハ全區平均一ヘクタール當4233.1

第　二

番號	區別	播種期	挿秧期	出穗期	成熟期	收穫當時 穗数	收穫當時 草丈	收穫當時 穗長	千粒重量	一ヘクタール重量
		月日	月日	月日	月日	本	cm	cm	g	kg
1	泡水區	7.13	8.1	10.17	11.17	10.5	97.1	17.8	29.4	59.9
2	水深四糎區	〃	〃	10.17	11.17	9.9	100.9	17.1	28.6	58.5
3	水深八糎區	〃	〃	10.18	11.18	8.3	101.3	17.7	28.4	57.8
4	水深拾貳糎區	〃	〃	10.19	11.19	9.2	101.5	17.8	29.4	56.5

備考 籾重量指数ハ全區平均一ヘクタール當3772.8

農業部農業試驗所 TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 1895

期　　作

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4191.5	7165.0	5373.8	23.4	79.4	99.0	0	1.0	良	99.0
4102.9	7223.4	5198.2	22.8	80.6	98.0	0	2.0	〃	96.9
4240.4	7585.7	5810.9	22.8	80.0	98.0	0	2.0	〃	100.2
4397.4	7741.9	5810.9	22.6	80.0	96.0	1.0	3.0	〃	103.9

Kg ヲ以テ標準トセリ

期　　作

籾		一ヘクタール当藁重量	玄米						籾重量指数
一ヘクタール当重量	一ヘクタール当容量		千粒重量	一ヘクトリットル重量	良米	青米	死米	品質	
Kg	L	Kg	g	Kg	%	%	%		%
4079.1	6809.9	5893.8	24.6	80.6	87.0	13.0	0	良	108.1
3443.2	5885.8	6514.2	23.8	80.6	81.0	18.0	1.0	稍良	91.3
3567.3	6171.8	5583.6	24.0	80.6	85.0	14.0	1.0	稍良	94.6
4001.6	7082.4	6204.0	24.6	81.3	70.0	28.0	2.0	中上	106.1

Kg ヲ以テ標準トセリ